



05/05/2024
Journée mondiale
de l'hygiène des
mains

Désinfection des mains en chirurgie

COMMENT?



Se laver les mains:

Une fois le jour de l'opération ou si elles sont visiblement sales,
10 minutes avant la désinfection des mains chirurgicale.

QUAND?

- **AVANT** un contact direct avec le champ opératoire et des dispositifs médicaux ou du matériel stériles
- **AVANT** une intervention avec les mêmes exigences en matière d'asepsie



Désinfectant pour les mains:

Appliquer dans le creux de la main sèche
(actionner le distributeur avec le coude).



Durée d'action:

1,5 minutes*.



Réalisation:

Humidifier les mains et les avant-bras.

- Frotter les mains pendant 10 secondes
- Frotter les avant-bras pendant 10 secondes
- Frotter soigneusement les mains pendant 70 secondes en prêtant attention aux bouts des doigts et des pouces


Pendant ce temps, faire attention à bien garder les mains et les avant-bras humides pendant la durée d'action de 90 secondes; appliquer plus de désinfectant pour les mains si nécessaire.

Veuillez respecter les dispositions en matière d'hygiène de votre établissement..



Gants chirurgicaux:

Les mains doivent avoir séché à l'air libre avant d'enfiler les gants.



* selon le produit

Sources:
Kramer A, Hübner NO, Below H, Heidecke CD, Assadian O (2008) Improving adherence to surgical hand preparation.
J Hosp Infect 70 (Suppl1):35-43
KRINKO (2016) Bundesgesundheitsbl 59:1189-1220.



Research for
infection protection
hartmann-science-center.com