

Retirer les gants!

Quand il n'est pas nécessaire de porter des gants à usage unique

Quand les retirer?

Il n'est pas impérativement nécessaire de porter des gants en l'absence de risque d'exposition élevée au sang, aux fluides corporels, aux sécrétions, aux excréments ou à un environnement contaminé.

Contact direct avec le patient



Contact indirect avec le patient



Pourquoi pas?

Porter des gants inutilement ...



1 ... réduit l'adhérence à l'hygiène des mains et contribue ainsi à la propagation d'infections nosocomiales.

2 ... a un impact sur les relations interpersonnelles.

3 ... entraîne des lésions cutanées dues à l'humidité.

4 ... augmente la production de déchets superflus.

Autres activités:

Mesure de la glycémie, pose de respirateurs non invasifs et de canules à oxygènes, baigner, habiller, laver*, enduire de crème*, peigner, raser et positionner le patient, soin des oreilles et des yeux (sans sécrétion), manipulation des vaisseaux (sans saignement), distribution/collecte de plateaux-repas, administration orale de médicaments, changer la literie/faire le lit, etc.

* sauf pour la région anale et génitale ainsi que pour les lavages antimicrobiens

Sources:

1. RKI, Epid Bull 2024;10:6-9. 2. WHO (2009) Glove Use Information Leaflet. 3. Fuller et al. (2011) ICHE, 32(12):1194-9.

Porter des gants!

Quand il est nécessaire de porter des gants à usage unique


Quand les porter?

Il est nécessaire de porter des gants s'il y a un risque d'exposition élevée au sang, aux fluides corporels, aux sécrétions, aux excréments ou à un environnement contaminé.

Contact direct avec le patient



Contact indirect avec le patient



Remarque: respecter le règlement relatif à l'EPI.

Pourquoi?

Pour se protéger contre les agents pathogènes potentiels

À noter:



1 Il faut remplacer les gants pour éviter de répandre des germes à cause d'une perforation et/ou d'une contamination des gants.

2 Porter des gants ne remplace pas la désinfection des mains.

3 Éviter tout contact avec les gants et son propre visage/ses propres cheveux.

Autres activités:

Épidémie ou situation d'urgence, pose et retrait de VVP, aspiration de systèmes de tubes endotrachéaux non fermés, etc.

* Résistance contre les substances chimiques testée conformément aux normes EN ISO 374-1 et -2, EN ISO 374-4 et -5, EN 16523-1, désigné comme équipement de protection individuelle conformément au Règlement (UE) 216/425 et à la norme EN ISO 21420.

Sources:

1. RKI, Epid Bull 2024;10:6-9. 2. WHO (2009) Glove Use Information Leaflet.