



5.5.2024
Giornata
mondiale
dell'igiene delle
mani

Disinfezione delle mani in chirurgia

COME?



Lavaggio delle mani:

Una volta il giorno dell'intervento o, se visibilmente sporche, almeno 10 minuti prima della disinfezione chirurgica delle mani.



Disinfettante per le mani:

Versare nel palmo della mano asciutta (premere il dispenser con il gomito).



Tempo d'azione:

1,5 minuti*.



Procedura:

Bagnare mani e avambracci.

- Strofinare le mani per 10 secondi
- Strofinare gli avambracci per 10 secondi
- Strofinare con cura le mani per 70 secondi, prestando particolare attenzione a polpastrelli e a pollici

Durante la procedura, assicurarsi che le mani e gli avambracci siano mantenuti umidi durante il tempo di esposizione di 90 secondi; se necessario rimuovere più volte il disinfettante per le mani.

Osservare le norme igieniche interne.




Guanti chirurgici:

Indossare i guanti soltanto dopo avere lasciato asciugare le mani all'aria.

QUANDO?

- **PRIMA** del contatto diretto con il campo operatorio e con dispositivi o materiali medici sterili
- **PRIMA** di altre procedure che prevedono gli stessi requisiti di asepsi



* a seconda del prodotto

Fonte:
Kramer A, Hübner NO, Below H, Heidecke CD, Assadian O (2008) Improving adherence to surgical hand preparation. J Hosp Infect 70 (Suppl1):35-43
KRINKO (2016) Bundesgesundheitsbl 59:1189-1220.



Research for
infection protection
hartmann-science-center.com