

인크렉사주 툴라스로마이신 (Increxxa inj) 처방대상 동물용의약품



인크렉사는 호흡기 질병을 유발하는 다양한 세균에 대해 효과적인 예방 및 치료용 항생제입니다.

1) 믿을 수 있는 선택

인크렉사는 검증된 원료인 툴라스로마이신을 신뢰할 수 있는 회사인 엘랑코가 출시한 제품입니다. 엘랑코의 엄격한 품질규정에 따른 제조시설을 통해 제조되었으며 미국 FDA에도 정식 등록 완료된 제품입니다.

2) 신속한 분포와 긴 지속시간*

주성분인 툴라스로마이신은 투여 후 빠르게 흡수되어 폐와 면역세포에 고농도로 분포하여 호흡기 세균에 작용합니다. 고농도로 폐에 농축된 툴라스로마이신은 1회 투여로도 15일 이상 폐에 존재하여 호흡기 질병 예방관리에 적합합니다.

3) 검증된 효과

호흡기 질병은 다양한 병원체의 복합감염이 다발하며 질병발생 예방관리가 효과적이고 신속한 치료가 필요합니다. 툴라스로마이신은 15년 이상 양돈현장에서 사용되어오면서 호흡기 질병에 대한 치료효과와 폐사율 감소효과가 검증되었습니다.

성분 및 함량

본제 1mL 중
툴라스로마이신
(Tulathromycin)
.....100mg

포장단위

100mL

효능 및 효과

- 가. 툴라스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 예방 및 치료
- 나. 돼지 : 흉막폐렴(*Actinobacillus pleuropneumoniae*), 파스튜렐라 폐렴(*Pasteurella multocida*), 마이코플라즈마성 폐렴(*Mycoplasma hyopneumoniae*)
- 다. 소 : 만헤이미아 폐렴(*Mannheimia haemolytica*), 파스튜렐라 폐렴(*Pasteurella multocida*), 헤모필러스 폐렴(*Haemophilus somnus*), 마이코플라즈마성 폐렴(*Mycoplasma bovis*), 전염성각결막염(*Moraxella bovis*)

용법 및 용량

- 가. 돼지 : 체중 40kg 당 본제 1mL 를 이근부에 1 회 근육주사. 한 부위에 투여하는 주사량이 2mL 를 넘지 않도록 한다.
- 나. 소 : 40kg 당 본제 1mL 를 목부위에 1 회 피하주사. 한 부위에 투여하는 주사량이 5mL 를 넘지 않도록 한다.

주의사항

- * 제품 사용시 사용설명서에 기재된 모든 내용을 확인한 후 사용하십시오.
- * 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- * 본제 및 Macrolide계 항생제에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 동물에는 사용하지 마십시오.
- * Lincosamide계 및 다른 Macrolide계의 항생제와 병용하지 마십시오.
- * [휴약기간] 돼지 33일 / 소 49일(착유우 사용금지)

저장방법/유효기간

- * 실온(1~30°C)의 어둡고 건조한 곳에 보관하십시오.
- * 유효기간 : 제조일로부터 24개월

REF Benchaoui HA et al. Pharmacokinetics and lung tissue concentrations of tulathromycin in swine. J Vet Pharmacol Ther. 2004;27(4):203 10.

