

부 표

업 체 명 : 한국엘랑코동물약품(주)	최초허가일자 : 1980. 03. 25.
제 품 명 : 노빈-50 주사액(Novin-50 Inj.)	변경허가일자 : 1995. 01. 17.
허가번호 : 제 8 - 123 호(제조)	: 2003. 03. 18.
	: 2006. 03. 07.
	: 2008. 02. 26.
	: 2013. 06. 10.
	: 2018. 01. 19.
	: 2020. 08. 03.
	: 2021. 09. 29.

1. 원료약품 및 분량 (본제 1ml 중)

- 메탐피론(Methampyrone, 별규) ----- 500mg
- 벤질알코올(Benzyl Alcohol, 유럽약전) ----- 20mg
- 주사용수(Water for Injection, 미국약전) ----- 적당량

2. 제형 및 성상

가. 제형 : 주사제

나. 성상 : 담황색의 투명한 액체

3. 제조방법

상기 원료를 가지고 동물약품공정서 주사제제법에 준하여 제조한다.

4. 효능 및 효과

모든 동물의 열성, 동통성 질환의 진경, 진통, 해열작용.

5. 용법 및 용량

가. 대동물(소, 말) : 5~20ml

나. 중동물(돼지, 양) : 5~10ml

다. 소동물(개, 고양이) : 0.5~2ml (체중 kg당 0.44ml)

상기 양을 1일 1~2회 근육 또는 피하주사

6. 포장단위

10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml.

7. 저장방법 및 사용기간

가. 저장방법 : 실온(1~30℃)의 어두운 곳에 보관할 것.

나. 용기종류 : 밀봉용기

다. 사용기간 : 제조일로부터 24개월

8. 주의사항

가. 휴약기간

(1) 소, 말, 돼지 : 28일

그 외 축산물 생산을 위한 가축에 사용금지(유乳 생산동물 포함)

나. 사용방법상의 주의사항

(1) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.

(2) 오·남용에 의한 약화사고 및 경제적 손실을 초래할 수 있으므로 정해진 용법·용량을 준수하고, 동시에 동일 성분의 약품을 중복 투여하지 마십시오.

(3) 본 약제에 대한 쇼크가 있었던 동물에게는 사용하지 마십시오.

다. 기타 주의사항

(1) 수의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

(2) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.

(3) 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 사용하지 마십시오.

(4) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.

(5) 안전성 및 유효성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.

(6) 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기 처리하십시오.

(7) 오·남용을 방지하기 위하여 동물약품의 사용내역을 빠짐없이 기록하여 주십시오.

(8) 다 쓴 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

(9) 피부나 눈에 접촉 시에는 물로 깨끗이 씻어낸 후 이상 증상이 있을 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

(10) 오용 및 품질저하 방지를 위하여 공급된 용기나 포장지 이외의 다른 용기에 소분하여 보관하지 마십시오.

(11) 기타 제품에 대하여 문의사항이 있으신 경우 제조사로 연락하여 주시기 바랍니다.

(12) 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

9. 기준 및 시험방법

가. 제품의 기준 및 시험방법 : 별첨 1

나. 원료약품의 기준 및 시험방법 : 별첨 2

10. 비교

동물용 의약품

