

에비프로 프리사이스 (Avipro Precise)



성분 및 함량

본제 1수분 중
전염성 에프(F)낭병 바이러스
(IBDV, LC-75주)
..... 10^{3.0} EID₅₀ 이상

포장단위

5,000수분 x 10바이알

아비프로 프리사이스 감보로 예방을 위한 중간독 백신입니다.

- 1) 글로벌 양계백신 전문 회사인 Lohmann animal health에서 탄생되었습니다.
- 2) 감보로 중간독 백신으로서 전염성 F낭병의 예방, 임상증상 완화에 효과가 있습니다.

효능 및 효과

- 가. 대상축종 : 닭
나. 전염성 에프(F)낭병의 예방 및 임상증상의 완화

용법 및 용량

가. 백신접종 시기

- 육계

- 모체 항체가 없는 경우 : 7일부터
모체 항체가 있는 경우 : 14일부터

- 산란계

- 모체 항체가 없는 경우 : 7일부터
모체 항체가 있는 경우 : 3~4주부터

- 재접종 필요에 따라 첫 번째 접종 후 7일 째에 실시

나. 접종방법 : 음수접종

- 보통 2시간 이내에 섭취될 수 있는 적절한 양의 백신을 준비하여야 하며, 희석 후에 바로 사용하여야 합니다.

- 백신 투여 전 2~3시간 동안 절수시킨 후 닭의 일령에 따라 섭취할 수 있는 적절한 양의 물에 본 백신을 희석하여 사용합니다.

※ 보통 10일령의 닭 1,000수는 하루 동안 10L의 물을 섭취합니다.

주의사항

- * 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- * 본제에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 동물에는 사용하지 마십시오.
- * 산란 중이거나 산란개시 직전의 개체에는 사용하지 마십시오.
- * 백신의 효력을 저해하지 않기 위해 음수소독약은 접종 2일 전에 사용을 중지 하십시오.

저장방법/유효기간

- * 직사광선을 피하여 냉장소(2~8℃)에 보관하십시오. 얼리지 마십시오.
- * 유효기간 : 제조일로부터 36개월

