

바이트릴 50주 (Baytril 50inj)

처방대상 동물용의약품



성분 및 함량

본제 1mL 중
엔로플록사신(Enrofloxacin)
.....50mg

포장단위

50mL, 100mL

바이트릴 50주는 소화기와 호흡기 질환을 유발하는 다양한 세균에 대해 효과적이고 빠르게 작용하는 광범위 농도의존성 살균제입니다.

1) 넓은 항균범위의 검증된 살균효과

바이트릴 50주는 살모넬라증, 대장균증과 같은 소화기 질환과 마이코플라즈마성 폐렴, 홍막폐렴, 파스튜렐라 폐렴과 같은 주요 호흡기 질환을 유발하는 다양한 세균에 대해 높은 감수성을 나타내는 광범위 농도의존성 살균제입니다.

2) 신속한 치료효과와 내성세균 억제작용

바이트릴 50주는 투여 후 1시간 이내에 감염 부위로 빠르게 흡수되어 신속한 살균 효과를 나타내며, 내성세균 억제농도(MPC)보다 높은 농도로 분포함으로써 내성세균의 선택적 증가를 효과적으로 방지하는 농도의존성 항균제입니다.

3) 오리지널 엔로플록사신

바이트릴은 30년 이상 축적된 고객들의 사용경험과 검증된 자료를 보유한 오리지널 제품입니다. 오리지널 엔로플록사신 원료를 사용하여 유사 제품보다 10일 이상 짧은 돼지의 휴약기간을 가지고 있습니다.

효능 및 효과

- 가. 엔로플록사신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료
- 나. 돼지 : 살모넬라증(*Salmonella spp.*), 대장균증(설사증, 장독혈증, *E.coli*), 마이코플라즈마성 폐렴(*Mycoplasma hyopneumoniae*), 홍막폐렴(*Actinobacillus pleuropneumoniae*), 파스튜렐라 폐렴(*Pasteurella spp.*), 기관지 폐렴(*Bordetella spp.*)
- 다. 송아지 : 대장균증(*E.coli*), 마이코플라즈마증(*Mycoplasma bovis*), 살모넬라증(*Salmonella typhimurium*), 파스튜렐라 폐렴(*Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida*)

용법 및 용량

돼지 : 근육주사, 송아지 : 피하주사

대상축종	일반 세균성질병	중증의 호흡기/ 소화기질병	살모넬라증
돼지, 송아지	1일 체중 10kg당 0.5mL를 3일 투여	1일 체중 10kg당 1mL를 3~5일 투여	1일 체중 10kg당 1mL를 5일 투여

주의사항

- * 제품 사용시 사용설명서에 기재된 모든 내용을 확인한 후 사용하십시오.
- * 마크로라이드계, 테트라사이클린계 항생제와 병용하지 마십시오.
- * [휴약기간] 돼지 10일, 소 14일(우유:4일)

저장방법/유효기간

- * 실온(1~30℃)의 어두운 곳에 보관하십시오.
- * 유효기간 : 제조일로부터 24개월

