

## 부표

업체명 : 한국엘랑코 동물약품(주)	최초허가일자 : 1998. 12. 30.
제품명 : 타이란 100(Tylan 100)	변경허가일자 : 2003. 08. 07.
허가번호 : 제 111-005 호	2011. 03. 24.
	2012. 03. 30.
	2018. 02. 21.
	2020. 01. 20.
	2021. 12. 27.

1. 원료 약품 및 분량(본제 1kg 중)
  - 타일로신인산염(Tylosin phosphate, 별규1)-----100g(역가)
  - 대두피(Soybean Mill Run, 별규2)-----적당량
  - 미네랄 오일(별규3)-----적당량

### 2. 제형 및 성상

가. 제형: 산제

나. 성상: 황갈색의 가루

### 3. 제조 방법:

제조원의 제조방법에 따른다.

### 4. 효능 및 효과

타일로신에 감수성이 있는 세균성 질병의 예방 및 치료

가. 돼지: 마이코플라즈마성 폐렴(*Mycoplasma hyopneumoniae*) 예방 및 치료

증식성회장염(*Lawsonia intracelluris*) 예방 및 치료

돼지 적리(*Serpulina hyodysentery*) 예방

나. 비육우: 간농양(*Fusobacterium necrophorum*) 예방

5. 용법 및 용량

일일 사료 ton당 다음의 용량을 균일하게 혼합하여 경구투여

가. 돼지

1) 예방 - 어린돼지 : 본제 220-1,100g

- 육성돈, 비육돈 전기 : 본제 220-440g

2) 치료 - 마이코플라즈마성 폐렴, 증식성회장염: 본제 1.1kg을 21일간 투여

나. 비육우(큰소 비육중기) : 본제 88-110g

6. 포장단위

2kg, 5kg, 10kg, 20kg, 22.7kg(50파운드)

7. 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법: 실온(1-30℃)의 건암소에 보관.

나. 용기 종류: 밀폐용기

다. 유효기간: 제조일로부터 24개월

8. 주의사항

가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것.

본제 및 Macrolide계 항생제에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 동물에게 사용하지 마십시오.

나. 부작용

1) 본제 성분 중 타일로신은 돼지의 직장부종, 설사 및 부분적 항문 탈장 등을 유발할 수 있습니다.

2) 본제 성분 중 타일로신은 소의 제1위 정체, 유량감소 및 설사를 유발할 수 있습니다.

다. 상호작용

Lincosamide계 및 다른 Macrolide계 항생제와 병용하지 마십시오.

라. 적용상의 주의

사료에 혼합하여 투여할 경우 균질하게 혼합되지 않으면 약화사고를 초래하거나 투여 목적을 달성할 수 없으므로 골고루 잘 혼합하여 사용하십시오.

마. 휴약기간

소, 돼지: 없음

바. 저장상의 주의사항

- 1) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
- 2) 유효성 및 안정성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.
- 3) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기 처리하십시오.
- 4) 개봉 후에는 가급적 빨리 사용하고 남은 것은 본래 포장용기를 밀봉하여 습기와 광선이 차단된 장소에 보관하십시오.
- 5) 다 쓴 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

사. 기타 주의사항

- 1) 본 제품은 동물용 의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.
- 2) 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 3) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- 4) 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
- 5) 오남용 및 내성출현 예방을 위하여 동물약품의 사용내역을 빠짐없이 기록하여 주십시오.
- 6) 오남용에 의한 약화사고 및 축산식품에 잔류 등 경제적손실을 초래할 수 있으므로 정해진 용법 용량을 준수하십시오.
- 7) 남용에 의해 약화사고와 경제적 손실을 초래할 수 있으므로 본제를 투여하면서 동시에 동일성분의 약품을 중복투여하지 마십시오.
- 8) 휴약기간을 준수하지 않을 경우 축체에 약물이 잔류될 수 있으므로 시간까지 정확히 계산하여 준수하십시오.

- 9) 취급자는 장갑, 마스크, 보호의 등 보호장구를 착용하여 직접적인 피부 접촉이나 흡입을 피하여 주십시오.
- 10) 약품 취급시 피부나 눈에 접촉되었을 경우는 즉시 깨끗이 씻어 낸 후 이상증상이 발견되는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- 11) 제품에 대하여 문의하실 사항이 있으신 경우 제조사 또는 수입사로 연락하여 주시기 바랍니다.

## 9. 기준 및 시험방법

가. 제품의 기준 및 시험방법: 별첨 1

나. 원료의 기준 및 시험방법: 별첨 2

## 10. 비고

가. 처방대상 동물용의약품

나. 제조국: 영국

다. 제조사: Rumenco Limited, Trading as Nettex

(Eastern Avenue, Lichfield, Staffordshire, WS13 7SE, United Kingdom)