

틸맥스 250 (Tilmax 250 OS) 처방대상 동물용 의약품



성분 및 함량
본제 1L 중
틸미코신 인산염(Tilmicosin
phosphate)
.....333.3g
(틸미코신 Tilmicosin으로서
250.0g)

포장단위
1L

틸맥스 250은 닭, 돼지에서 호흡기 질병 치료제입니다.

1) 검증된 효과와 품질

틸맥스 250은 마이코플라즈마에 대해서 높은 감수성을 지니고 있으며 열랑코의 엄격한 품질관리를 통해 신뢰할 수 있는 효과를 나타냅니다.

2) 신속한 체내 분포와 오래 지속되는 약효

경구 투여 후 4시간 전후에 최대 혈장 농도에 도달하고 지속적으로 체내에서 약효를 나타내 마이코플라즈마병의 발현을 막아줍니다.

3) 간편한 투약방법

권장 용량에 따라 음수에 희석하여 손쉽게 투여할 수 있습니다.

효능 및 효과

틸미코신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료
가. 돼지

- 파스튜렐라 폐렴(*Pasteurella multocida*)
 - 홍막폐렴(*Actinobacillus pleuropneumoniae*)
 - 마이코플라즈마성 폐렴(*Mycoplasma hyopneumoniae*)
- 나. 닭
- 마이코플라즈마병(*Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae*)

용법 및 용량

가. 돼지 : 일일 음수 L당 본제 0.8mL(틸미코신으로서 200mg)을 희석하여 5일간 음수 투여합니다.

나. 닭 : 일일 음수 L당 본제 0.3mL(틸미코신으로서 75mg)을 희석하여 3~5일간 음수 투여합니다.

주의사항

- * 제품 사용시 사용설명서에 기재된 모든 내용을 확인한 후 사용하십시오.
- * 본제 및 Macrolide계 항생제에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 동물에는 사용하지 마십시오.
- * Lincosamide계 및 다른 Macrolide계의 항생제와 병용하지 마십시오.
- * 임신중인 돼지와 번식 목적의 돼지에는 사용하지 마십시오.
- * 산란중인 닭에는 사용하지 마십시오.
- * 음수에 혼합하여 투여할 경우 균질하게 혼합되지 않으면 약화사고를 초래하거나 투여목적을 달성할 수 없으므로 골고루 잘 혼합하여 사용하십시오.
- * [휴약기간] 닭 10일(산란 개시 8주 전부터 사용 금지) / 돼지 7일

저장방법/유효기간

- * 직사광선을 피하여 실온(1~30°C)에 보관하십시오.
- * 유효기간 : 제조일로부터 24개월

