

비타-린칼 과립 (Vita-Rinkal pellet)



성분 및 함량

본제 1kg 중 제3인산 칼슘224g

비타민 A150,000IU

비타민 D330,000IU

염화나트륨 30g

프로피온산 칼슘1g

포장단위

20kg

비타-린칼 과립은 성장에 필수적이며 임신/비유 중인 소에서 필요한 인과 칼슘이 강화된 동물용약품입니다.

1) 성장 및 건강유지를 위해 필요한 영양소를 가지고 있습니다.

칼슘, 인뿐만 아니라 비타민 A, D3 등이 함유되어 이용률이 더욱 뛰어나습니다. 칼슘과 인의 함량 비율이 1.7:1로 가축의 요구량 비율에 가깝습니다.

2) 흡수 및 이용률을 높이기 위해 펠렛으로 만들었습니다.

■ 효능 및 효과

가. 소

인, 칼슘 및 비타민 A, D3 결핍에 의한 골연증, 케토시스, 후산정체의 예방, 비타민 A, D3, 미량 광물질 결핍증의 예방, 성장 촉진, 항병력 강화에 도움을 줌.

나. 돼지

인, 칼슘 및 비타민 A, D3 결핍에 의한 골연증, 후구마비, 번식장애의 예방 및 치료, 성장촉진 및 사료효율개선

다. 닭

난각질 강화, 연란 및 파란 방지, 산란 성적 개선, 인, 칼슘, 비타민 A, D3 결핍에 의한 골연화증 예방 및 치료

■ 용법 및 용량

가. 소 : 1일 1두당 다음 용량을 사료에 균등하게 혼합하여 급여합니다.

송아지	50~60g
육성우/성우	60~140g
착유우	120~220g

※ 송아지는 14일 이상 연속 급여하지 마십시오.

※ 착유우는 1일 유량 18kg 이상인 경우 유량 1kg 증가당 본제 10g 증량 급여합니다.

나. 돼지 : 1일 1두당 다음 용량을 사료에 균등하게 혼합하여 급여합니다.

육성/비육돈	20~40g
임신돈	40~60g
수유모돈	60~90g

다. 양계 : 사료톤당 4kg을 균등하게 혼합하여 투여합니다.

■ 주의사항

* 제품 사용시 사용설명서에 기재된 모든 내용을 확인한 후 사용하십시오.

* 송아지의 경우 14일 이상 연속 투여하지 마십시오.

■ 저장방법/사용기간

* 직사광선을 피하여 실온(1~30°C)의 건조한 곳에 보관하십시오.

* 사용기간 : 제조일로부터 24개월

