

# 바이트릴 맥스 (Baytril Max)

처방대상 동물용의약품



**성분 및 함량**

본제 1mL 중  
엔로플록사신(Enrofloxacin)  
.....100mg

포장단위  
100mL

바이트릴 맥스는 개선된 포몰레이션을 통해 더욱 빠르고 효과적인 항균력을 나타내는 원샷 치료제입니다.

**1) 더욱 신속하고 효과적인 항균력**

엔로플록사신은 농도가 높아지면 효과가 증가하는 농도의존성 항균제입니다. 개선된 포몰레이션을 통해 고용량으로 투약된 바이트릴 맥스는 농도의존성 항균제의 특성에 따라 빠른 치료효과를 나타냅니다.

**2) 원샷 치료제**

개선된 포몰레이션은 고용량의 엔로플록사신을 단 1회로 투약가능하게 만들었습니다.

**3) 빠른 치료 & 빠른 회복**

높은 농도의 엔로플록사신은 더욱 빠르고 효과적으로 작용하여 질병증상의 빠른 치료와 빠른 회복을 가능하게 합니다. 이를 통해 동물의 스트레스는 감소되고, 동물복지는 개선됩니다.

**효능 및 효과**

- 가. 엔로플록사신에 감수성이 있는 세균성 호흡기 질환의 치료
- 나. 돼지 : 흉막폐렴(*Actinobacillus pleuropneumoniae*), 파스튜렐라 폐렴(*Pasteurella multocida*), 글래서병(*Haemophilus parasuis*), 연쇄상구균증(*Streptococcus suis*), 기관지 폐렴(*Bordetella bronchiseptica*)
- 다. 소 : 파스튜렐라 폐렴(*Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*), 헤모필루스 감염증(*Haemophilus somnus*), 마이코플라즈마증(*Mycoplasma spp.*)
- 라. 자돈에서 대장균증(*Colibacillosis*)의 치료

**용법 및 용량**

대상축종	용법	용량				
돼지	근육주사, 피하주사	체중 20kg당 1.5mL를 1회에 한하여 주사(7.5mg/kgBW)				
소	피하주사	체중 100kg당 7.5mL를 1회에 한하여 주사(7.5mg/kgBW)				
체중(kg)	13.3	20	40	60	80	100
투여용량(mL)	1	1.5	3	4.5	6	7.5

**주의사항**

- \* 제품 사용시 사용설명서에 기재된 모든 내용을 확인한 후 사용하십시오.
- \* 임신과 비유 중에도 사용하여도 무방합니다.
- \* 한 부위에 소는 15mL이 넘지 않게, 돼지는 5mL이 넘지 않게 주사합니다.
- \* 유통 중 보관조건보다 낮은 온도에 일시적으로 노출되면 결정이 생성될 수 있습니다. 따뜻하게 하여 녹인 후 사용하거나 구입처에 문의바랍니다.
- \* [휴약기간]  
- 돼지(피하, 근육주사시) 14일 / 소(피하주사) 식욕 14일, 우유 3일

**저장방법/유효기간**

- \* 실온(1~30°C)에서 보관하십시오.
- \* 유효기간 : 제조일로부터 36개월

