



TRUCID™

FICHA TÉCNICA

TRUCID®
LA EVOLUCIÓN DE LA DORAMECTINA



TRUCID®

LA EVOLUCIÓN DE LA DORAMECTINA

Doramectina 1% p/v Solución Inyectable

Contenido del envase: 500 mL

Especie de destino: Bovinos



COMPOSICIÓN



Cada 100 mL contiene:

Doramectina 1 g

Excipientes c.s.p. 100 mL

INDICACIONES DE USO

Para el tratamiento y control de los siguientes parásitos de los bovinos:



NEMÁTODOS GASTROINTESTINALES

Ostertagia lyrata (adultos y L4), *Ostertagia ostertagi* (adultos L3-L4 incluyendo larvas inhibidas) *Haemonchus contortus*, *Haemonchus placei* (adultos L3-L4) *Trichostrongylus axei* (adultos y L4), *Trichostrongylus colubriformis* (adultos y L4) *Cooperia oncophora* (adultos y L4), *Cooperia pectinata* (adultos y L4), *Cooperia punctata* (adultos y L4), *Cooperia spp* (adultos y L3) *Nematodirus helvetianus* (adultos), *Nematodirus spathiger* (adultos) *Bunostomum phlebotomum* (adultos L3-L4) *Strongyloides papillosus* (adultos) *Oesophagostomum radiatum* (adultos L3-L4).



NEMÁTODOS PULMONARES

Dyctiocaulus viviparus (Adultos y L4).



ECTOPARÁSITOS

Piojos chupadores (*Haematopinus eurysternus* y *Linognathus vituli*).
Piojos masticadores (*Bovicola bovis*).
Ácaros (*Psoroptes bovis* var. *bovis* y *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*).

DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Administrar 1 ml de Trucid® por cada 50 kg de peso corporal, lo que equivale a 200 µg de Doramectina por kg de peso, como dosis única.

Para mayor referencia, véase la tabla a continuación:

TABLA DE DOSIFICACIÓN EN BOVINOS

Peso (kg)	Dosis en mL	Peso (kg)	Dosis en mL
Hasta 50	1	301-350	7
51-100	2	351-400	8
101-150	3	401-450	9
151-200	4	451-500	10
201-250	5	501-550	11
251-300	6	551-600	12

Vía de administración: Subcutánea

Modo de empleo: Inyectar bajo la piel de la región del cuello o de la paleta. Utilizar una aguja de 15-20 mm de largo y de calibre 16. Emplear equipo estéril y seguir los procedimientos de asepsia desinfectando previamente la zona de inyección con alcohol.

CONTRAINDICACIONES

No administrar por vía intramuscular o intravenosa.

No usar en vacas lactantes cuya leche sea destinada a consumo humano.

No administrar en caso de hipersensibilidad conocida al principio activo.

EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

No se han descrito reacciones adversas a las dosis recomendadas. Eventualmente, pueden ocurrir reacciones locales leves y transitorias en el sitio de la aplicación, que desaparecen sin necesidad de tratamiento.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños.

No almacenar o aplicar junto con la comida, bebestibles, medicinas y productos de higiene domésticos.

No contamine cursos de agua puesto que podría resultar peligroso para los peces y otros organismos acuáticos.

Limpie el equipamiento y contenedores utilizados de forma segura, evitando la contaminación ambiental.

Volumen máximo de inyección: 5 mL por punto de inyección.

Personas con hipersensibilidad conocida a la sustancia activa deben evitar el contacto con el producto.

No fume, coma ni beba mientras manipula el producto.

No manipular el producto con las manos descubiertas.

Lave bien las manos después de manejar el producto.

Evitar el contacto con el producto dado que puede ser irritante para la piel y ojos.

En caso de contacto accidental, lavar inmediatamente el área afectada con agua y

jabón. En caso de exposición ocular, lavar ojos con agua y buscar atención médica inmediata. En caso de emergencia se deben tomar las siguientes medidas de primeros auxilios: Inhalación: Conducir al aire fresco. Si los síntomas persisten, busque un médico. Contacto con la piel: Retirar toda la ropa contaminada. Tras el contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón en abundancia. En el caso de que haya irritación, busque un médico. Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con mucha agua y buscar un médico. Ingestión: En el caso de ingestión, consultar inmediatamente el médico y mostrar el envase o el rótulo. Enjuagar la boca. No inducir el vómito. Síntomas y efectos más importantes, agudos o tardíos: El producto puede causar disturbios respiratorios, flaqueza, ataxia y temblores. Notas al médico: Medidas terapéuticas: cuidados generales, descontaminación y tratamiento sintomático.

PERIODO DE RESGUARDO:

Carne: 59 días

Leche: No usar en vacas que producen leche destinada a consumo humano.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO SIN UTILIZAR O EL MATERIAL DE DESECHO:

No arrojar envases vacíos o con restos del producto con los desechos domésticos. Los organismos acuáticos son altamente sensibles a la toxicidad de doramectina, por lo cual no se debe eliminar recipientes vacíos ni su contenido residual en ningún curso de agua. Se recomienda contactar a la empresa importadora o a empresas especializadas para recibir instrucciones respecto su correcta eliminación.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener en un lugar seco y fresco, a temperatura ambiente, entre 15 °C y 30 °C, protegido de la luz solar directa y fuera del alcance de niños y animales domésticos. Utilizar inmediatamente una vez extraída la primera dosis y descartar el producto sobrante.

VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA

Fabricado por:

Elanco Animal Health Korea Co., Ltd.

14, Neungan-ro.

Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea

Importado y distribuido por:

Elanco Chile SpA.

Rosario Norte 615 of. 1502, piso 15

Las Condes, Santiago, Chile

Bajo licencia de: Elanco Animal Health Inc., USA

Servicio de Atención al Cliente: 800 004 202

USO VETERINARIO

Reg. SAG N° 2511-B

TRUCID[®]

LA EVOLUCIÓN DE LA DORAMECTINA

