

아지타 10과립 (Agita 10 WG)



No 23603111



성분 및 함량

본제 1kg 중
 Thiamethoxam.....100g
 Z-9-tricosene0.5g
 Sugar적량

포장단위
 400g/통

아지타 10과립은 파리에 대한 기호성이 높은 미끼(유당)가 함유되어 효과적으로 파리를 유인하여 살멸할 수 있는 살충제입니다.

1) 아지타의 작용기전

- 파리를 유인하는 성 호르몬(Z-9-tricosene)이 있어 이성으로 착각하여 접근합니다.
- 백당(Sugar)이 있어 짹짹기를 위해 접근한 파리들이 섭취하도록 합니다.
- Thiamethoxam의 작용(신경계 과흥분)으로 살멸하며, 접촉한 다른 파리도 같이 신경계 과흥분으로 살멸하기 됩니다.

효능 및 효과

축사의 파리 구제

용법 및 용량

가. 도포(칠)하는 방법:

본제 400g을 미지근한 물 320mL에 잘 녹인 후 축사 바닥 면적 160m²(48.4평)인 벽, 천정 320~480m² 면적 중 파리가 많이 모이는 장소(따뜻하고 햇빛이 잘 드는 벽, 창문틀, 착유라인, 급이기외부 등)를 선정해 10×30cm의 크기 30개 정도로 약을 칠하여 파리를 구제한다. 간혹 약을 칠하기 어려운 부분에는 판지, 폴리에틸렌에 약을 칠하여 매달아둔다. 6~8주 간격으로 재 도포한다.

나. 분무(부분적 분무)하는 방법:

본제 400g을 미지근한 물 3200mL에 잘 녹인 후 축사 바닥 면적 80m²(24.2평)인 벽, 천정 160~240m² 면적 중 파리가 많이 모이는 장소(따뜻하고 햇빛이 잘 드는 장소, 벽, 창문틀)에 희석된 약 30% 면적에 집중적으로 분무하여 파리를 구제한다. 4~6주 간격으로 재분무한다.

다. 약효지속시간은 축사의 환경, 온도, 습도에 영향이 있으므로 약효의 변화에 따라 재사용한다.

주의사항

- * 꿀벌에 피해가 있으므로 약을 처리한 농장 주변에서는 꿀벌을 기르지 마십시오.
- * 가축의 사료, 분뇨 등이 묻은 더러운 벽에는 약효가 떨어질 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- * 약을 바른 부분은 비를 맞지 않게 주의하십시오.
- * 새로 칠한 흰 벽에는 얼룩이 지므로 사용하지 마십시오.
- * 친환경 농가에 사용하지 마십시오.

저장방법/유통기간

- * 밀폐용기에 넣어 환기가 잘 되고 건조한 곳에 햇빛을 피하여 보관하십시오.
- * 유통기간 : 제조일로부터 36개월