



바이멕은 광범위한 지속성 주사용 내/외부 기생충 동시 구제제로서 한번의 주사로 효과적인 구충효과를 나타냅니다.

1) 광범위한 기생충 구제제입니다.

돼지와 소에 관련된 대부분의 내/외부 기생충에 대해 광범위한 효과를 가진 유충 및 성충 구제제입니다.

2) 효과가 오래 지속되어 기생충 재감염 방지에 효과적입니다.

바이멕은 1회 주사로 3주간 효능이 지속되어, 주요 기생충 생활사보다 효과가 오래 지속되기 때문에 재감염을 방지하는데 매우 효과적입니다.

성분 및 함량

본제 1mL 중
이버멕틴(ivermectin)
.....10mg

포장단위

100mL

효능 및 효과

돼지와 소 기생충 구제
가. 돼지

Oesophagostomum spp. 장결절충속, *Hyostrongylus rubidus* 홍색모양선충, *Ascaris suum* 돼지회충, *Strongyloides ransomi* 돼지분선충, *Trichuris suis* 돼지편충, *Metastrongylus* spp. 의원충속, *Stephanurus dentatus* 돼지신충, *Haematopinus suis* 돼지이, *Sarcoptes scabiei* var. *suis* 개선충
나. 소

Ostertagia spp. 갈색위충속, *Trichostrongylus* spp. 모양선충속, *Oesophagostomum radiatum* 소장결절충, *Haemonchus placei* 플라스염전위충, *Bunostomum phlebotomum* 소구충, *Cooperia* spp. 쿠퍼위충속, *Nematodirus* spp. 세경모양선충속, *Dictyocaulus viviparus* 소폐충, *Hypoderma* spp. 쇠가죽파리속구더기, *Haematopinus eurysternus* 짧은 코소이, *Linognathus vituli* 소 가는이, *Damalinia bovis* 소털이, *Psoroptes ovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*, *Chorioptes bovis* 개선충

용법 및 용량

가. 소

체중 kg당 본제 0.02mL(이버멕틴으로서 0.2mg)를 1회 피하주사 합니다.

※ 단, 한 부위 당 주사량이 10mL가 넘지 않도록 하십시오.

나. 돼지

체중 kg당 본제 0.03mL(이버멕틴으로서 0.3mg)를 1회 피하주사 합니다.

※ 단, 한 부위 당 주사량이 5mL가 넘지 않도록 하십시오.

모든(용돈)	육성돈(구입돈)	비육돈	이유자돈
6-8mL	1mL	2mL	0.5mL

주의사항

* 제품 사용시 사용설명서에 기재된 모든 내용을 확인한 후 사용하십시오.

* 본제를 근육주사나 정맥주사 하지 마십시오.

* [휴약기간] 돼지 28일 / 소 35일, 우유 28일

저장방법/사용기간

* 실온(1~30°C)의 어두운 곳에 보관하십시오.

* 사용기간 : 제조일로부터 24개월

