

		<p>(1) 성주기에 상관없이 본제를 14일 간격으로 2회 주사한다. (2차 주사 후 2~4일에 발정 유도).</p> <p>(2) PGF2a+GnRH 프로그램 : GnRH 주사 (0일)후 7일에 본제 주사(7일), 48시간 후 GnRH 주사(9일), 2차 GnRH 주사 후 8~24시간에 인공수정을 실시한다.</p> <p>나. 무발정의 치료 0일 : 프로게스테론(P4) 장치를 삽입하고 GnRH를 1차 주사한다. 7일 : P4 장치를 제거하고 PGF2a를 주사한다. 그 이후에 다음 중 하나를 선택하여 실시한다: - 72시간 이내에 발정이 검출된 개체를 교배시키고, 10일째에 발정 징후가 없는 나머지 모든 암소에 GnRH를 2차 주사한 후 24시간 이내에 인공수정을 실시한다. - 9일째에 GnRH를 2차 주사한 후 16~20시간 사이에 인공수정을 실시한다.</p> <p>다. 난소기능장애(정상적인 황체를 보이거나 발정이 없는 경우) 직장검사를 통해 황체를 검사 후 투여, (투여 후 2~4일에 발정시작) 발정이 검출되면 인공수정을 실시한다. 발정이 검출되지 않으면 14일 후 추가 주사한다.</p> <p>라. 비정상적인 임신의 종식 임신 후 7~150일 사이에 투여, 투여 후 8일째에도 유산이 일어나지 않으면, 추가 투여한다. 처치한 동물은 태아 및 태반이 완전히 배출될 수 있도록 세심히 관찰한다. 임신 150일 이후에는 본제 단독으로는 임신중절이 불가능 하다</p> <p>마. 분만의 유도(일반적인 유도분만이 아닌 경우) 임신 270일 이후에 투여(투여 후 36~48시간 사이에 분만 시작)</p>
돼지	근육주사	<p>분만 예정일 3일 이내(임신 111~117일 사이)에 1 두당 0.7mL를 근육 주사한다(투여 후 36~48시간 사이에 분만 시작)</p>

6. 포장단위

20mL, 100mL

7. 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 직사광선을 피하여 실온(25℃ 이하)에 보관할 것

나. 용기종류 : 밀봉용기

다. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

8. 사용상의 주의사항

가. 다음 동물에 투여하지 말 것

임신동물에 사용 시 유산이 발생할 수 있으므로 유도분만 목적이 아닌 경우에는 절대 사용하지 마십시오.

나. 부작용

PGF2a를 근육주사 한 후 간혹 부작용이 관찰될 수 있으나 이러한 부작용은 보통 일시적이며 동물에 거의 해롭지 않습니다.

(1) 소에서, 권장용량의 5~10배 투여 시 체온 상승 및 유연이 있을 수 있습니다.

실험적으로 권장용량의 50~100배를 투여하였을 때, 초조, 유연, 유량감소가 나타났지만, 그 외의 부작용은 없었습니다.

(2) 돼지에서 드물게 호흡수 증가, 분만사 울타리를 물어뜯는 행동 등을 보일 수 있습니다.

다. 적용상의 주의

(1) 소에서 분만 유도를 목적으로 투여 시 투여 시기에 따라 태반정체가 나타날 수 있습니다.

(2) 돼지 미성숙 자돈의 출산을 막기 위하여 임신111일 이전의 분만 유도는 시도하지 마십시오.

(3) 정맥으로 주사하지 마십시오.

(4) 본제의 주성분은 피부를 통해 쉽게 흡수되고 임신기 여성이나 천식 등 기관지 질환이 있는 사람에서는 유산과 기관지 수축을 유발할 수 있으므로 본제를 취급할 경우에는 각별히 주의하시기 바랍니다.

라. 휴약기간

없음

마. 기타 주의사항

(1) 수의사의 처방 및 지시에 따라 사용하십시오.

(2) 본제를 사용 시에는 반드시 보호장갑을 착용하시고 피부에 접촉한 경우에는 물과 비누로 즉시 씻어낸 후 이상증상을 느끼는 경우 제품 사용설명서를 지참하여 즉시 의사와 상담하십시오.

(3) 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 사용하지 마십시오.

(4) 정해진 용법 용량을 준수하십시오.

(5) 사용설명서를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.

(6) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게서는 절대 사용하지 마십시오.

(7) 제품에 대하여 문의하실 사항이 있으신 경우 수입사로 연락하여 주시기 바랍니다.

(8) 개봉 후 가능한 한 빠른 시간 안에 사용하십시오.

(9) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.

(10) 안전성 및 유효성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.

(11) 유효기간이 경과한 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.

- (12) 오남용 및 내성출현 예방을 위하여 동물약품의 사용내역을 빠짐없이 기록하여 주십시오.
- (13) 다 쓴 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- (14) 오용 및 품질저하 방지를 위하여 공급된 용기나 포장지 이외의 다른 용기에 소분하여 보관하지 마십시오.
- (15) 만약 구입 시 유효(사용)기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- (16) 실수로 사람에게 주사했을 경우 즉시 사용설명(주의사항)을 지참하여 의사의 진료를 받으십시오.
- (17) 본 제품에서 이물질이 발견될 경우에는 사용하지 마십시오.
- (18) 다른 약제와 혼합하여 사용하지 마십시오.

9. 기준 및 시험방법

가. 제품의 기준 및 시험방법 : 별첨 1

나. 원료약품의 기준 및 시험방법 : 별첨 2

10. 비고 : 처방대상 동물용의약품

가. 제조국 : 뉴질랜드

나. 제조원 : Elanco New Zealand

106 Wiri Station Road, Manukau, Auckland 2104, New Zealand