

부 표

업 체 명: 한국엘랑코동물약품(주)

제 품 명: 아지타 10과립(AGITA 10 WG)

허가번호: 제 111 - 35 호

최초허가일자 : 2003. 10. 11.

변경허가일자 : 2004. 02. 11.

변경허가일자 : 2005. 05. 24.

변경허가일자 : 2007. 06. 21.

변경허가일자 : 2016. 12. 07.

변경허가일자 : 2017. 10. 26.

1. 원료약품 및 분량 (본제 1 kg 당)

◦ Thiamethoxam (별규)	100 g
◦ Z-9-tricosene (별규)	0.5 g
◦ Lignosulfonic acid(별규)	5 g
◦ Tensopol (USP)	15 g
◦ 유당 (Lactose, KVP)	100 g
◦ 백당 (Sugar, KVP)	적량

2. 성상

- 백색 내지 베이지색의 과립

3. 제조방법

- 제조원의 제조방법에 의함

4. 효능 및 효과

- 축사의 파리 구제

5. 용법 및 용량

- 도포(칠)하는 방법;

본제 400g을 미지근한 물 320ml에 잘 녹인 후 축사 바닥 면적 160m²(48.4평)인 벽, 천정 320~480m² 면적 중 파리가 많이 모이는 장소 (따뜻하고 햇빛이 잘 드는 벽, 창문틀, 착유라인, 급이기외부 등)를 선정해 10×30cm의 크기 30개 정도로 약을 칠하여 파리를 구제한다. 간혹 약을 칠하기 어려운 부분에는 판지, 폴리에틸렌에 약을 칠하여 매달아둔다. 6 주 ~ 8주 간격으로 재 도포한다.

- 분무(부분적 분무)하는 방법 ;

본제 400g을 미지근한 물 3200ml에 잘 녹인 후 축사 바닥 면적 80m²(24.2평)인 벽, 천정 160~240m² 면적 중 파리가 많이 모이는 장소 (따뜻하고 햇빛이 잘 드는 장소, 벽,

창문틀)에 희석된 약 30% 면적에 집중적으로 분무하여 파리를 구제한다.

4주 ~ 6주 간격으로 재분무한다.

*약효지속기간은 축사의 환경, 온도, 습도에 영향이 있으므로 약효의 변화에 따라 재사용한다.

6. 포장단위

- 200g, 400g

7. 저장방법 및 유효기간

- 저장방법 : 밀폐용기에 넣어 환기가 잘 되고 건조한 곳에 햇빛을 피하여 보관하십시오.

- 유효기간 : 제조일로부터 2년

8. 주의사항

- 약을 희석한 후에 빨리 사용 하십시오.
- 다른 약제와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 희석한 약을 방치한 후에 다시 사용할 경우에는 잘 혼합하여 사용하십시오.
- 꿀벌에 피해가 있으므로 약을 처리한 농장 주변에서는 꿀벌을 기르지 마십시오.
- 사료나 음수에 오염되지 않도록 주의 하십시오.
- 약을 사람이 먹었을 경우에는 많은 양의 물과 의료용 목탄을 먹이고 의식이 없을 경우에는 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.
- 취급 시 눈에 약이 묻었을 경우에는 수분간 깨끗한 물로 씻고 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.
- 사람이나 동물들이 먹지 않도록 주의 하십시오.
- 어린이나 가축이 닿지않는 곳에 사용하십시오.
- 사용 후에는 손을 깨끗이 씻으십시오.
- 가축의 사료, 분뇨등이 묻은 더러운 벽에는 약효가 떨어질 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 약을 바른 부분은 비를 맞지 않게 주의하십시오.
- 새로 칠한 흰 벽에는 얼룩이 지므로 사용하지 마십시오.
- 친환경 농가에 사용 금지

9. 비고

- 제조국 : 오스트리아 (Kwizda GmbH, Austria)
- 수출국 : 스위스 (Novartis Animal Health Inc.)