

# 올트라마이신 (Ultramycin)

처방대상 동물용의약품



올트라마이신은 옥시테트라사이클린을 주원료로 하는 광범위 항생제로서 다양한 질병을 효과적으로 치료하는데 편리하게 사용할 수 있는 수용성 산제입니다.

### 1) 항균 범위가 넓어 각종 세균 감염증에 광범위하게 적용

옥시테트라사이클린을 주원료로 하여 항균 범위가 넓고 특히 조직액, 임파액, 혈액 등 다양한 장기에 잘 분포하므로 다양한 부위의 세균 감염증을 치료하는데 효과적으로 사용할 수 있습니다.

### 2) 물에 잘 녹는 수용성 산제

물에 잘 녹아 투여하기가 간편하며 음수로 투여하므로 사료첨가에 비해 보다 신속하게 치료를 시작할 수 있습니다.

#### 성분 및 함량

본제 1kg 중  
옥시테트라사이클린  
(Oxytetracycline)으로서  
.....120g(약가)

#### 포장단위

1kg

#### 효능 및 효과

옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료

가. 소: 대장균증(*E.coli*), 파스튜렐라 폐렴(*Pasteurella multocida*)

나. 돼지: 대장균증(*E.coli*), 살모넬라증(*Salmonella choleraesuis*), 파스튜렐라 폐렴(*Pasteurella multocida*), 렘토스피라병(*Leptospira interrogans serovar Pomona*)

다. 닭: 마이코플라즈마성 관절활막염(*Mycoplasma synoviae*), 만성호흡기병(*Mycoplasma gallisepticum*), 대장균증(기낭염, *E.coli*), 가금콜레라(*Pasteurella multocida*)

#### 용법 및 용량

가. 소, 돼지: 일일 체중 10kg당 본제 1.8g을 희석하여 7~14일간 음수로 투여합니다.

나. 닭

- 마이코플라즈마성 관절활막염: 일일 음수 L당 본제 0.4~0.9g을 희석하여 7~14일간 음수 투여합니다.

- 만성호흡기병, 대장균증, 가금콜레라: 일일 음수 L당 본제 0.9~1.8g을 희석하여 7~14일간 음수 투여합니다.

#### 주의사항

\* 제품 사용시 사용설명서에 기재된 모든 내용을 확인한 후 사용하십시오.

\* 휴약기간을 준수하지 않을 경우 축산물 내에 잔류될 수 있으므로 시간까지 정확히 계산하여 준수하십시오.

\* 본제 및 Tetracycline계 항생제에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 동물에는 사용하지 않습니다.

\* Cephalosporin계, Penicillin계 및 다른 Tetracycline계 항생제와 병용하지 않습니다.

\* 산란 중인 닭과 착유 중인 젖소에는 사용하지 않습니다.

\* [휴약기간] 소, 돼지, 닭 5일 / 계란 0일

#### 저장방법/유효기간

\* 실온(1~30°C)의 어두운 곳에 보관하십시오.

\* 유효기간: 제조일로부터 24개월

