

# 페이린 20 (Paylean 20)

No 23928887

처방대상 동물용 의약품



페이린20은 비육말기에 투여하여 사료효율 및 일당 증체량을 개선하여 최종적으로 출하일령을 7~10일 단축시켜 주는 제품입니다.

- 1) 평균 일당 증체량이 증가합니다.
- 2) 1+ 등급 출현율이 증가합니다.
- 3) 지육율이 향상됩니다.
- 4) 출하일령이 단축됩니다.
- 5) 사료요구율이 감소됩니다.
- 6) 본 제품의 효과를 보기 위해선 사료 내 라이신 함량이 0.9% 이상 되어야 합니다.

### 효능 및 효과

돼지에서 증체율과 사료효율 개선, 정육율 향상, 지육에서의 살코기 비율 향상

### 용법 및 용량

가. 증체율 향상, 사료효율 개선: 사료톤당 본제 250~500g (5~10ppm) 투여  
 나. 지육에서의 살코기 비율 향상, 도체의 정육율 향상: 사료톤당 본제 500~1000g(10~20ppm) 투여

### 성분 및 함량

본제 1kg 중  
 락토파민 염산염  
 (Ractopamine  
 hydrochloride).....20g  
 콩기름 (Soybean oil)  
 .....10g  
 옥수수 속대 (ground corn  
 cobs) .....적량

### 포장단위

10kg

### 주의사항

- \* 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- \* 번식동물에서 번식성적에 대한 락토파민의 영향이 시험되지 않았으므로 사용하지 마십시오.
- \* 사람에게 사용하지 마십시오.
- \* 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- \* 심혈관계 질환이 있는 사람은 이 제품에 노출되지 않도록 사용 시 각별히 주의하십시오.
- \* 페이린은 취급 시에는 방호복과, 장갑, 보호안경, 분진마스크를 착용하십시오.
- \* 눈에 들어갔을 때에는 즉시 물로 완전히 씻어내시고, 통증이 계속되면 의사에게 문의하십시오.
- \* [휴약기간] 없음

### 저장방법/사용기간

- \* 건조하고 햇빛이 비치지 않는 서늘한 곳에 보관하십시오.
- \* 사용기간: 제조일로부터 36개월

