

ETIKETA

Neporex 2 SG

Růstový regulátor, který působí negativně na vývoj larev much.

Složení:

Účinná látka 2% cyromazin t. j. N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (20 g/1 kg)

Číslo ES: 266-257-8

Charakteristika přípravku

Neporex 2 SG je larvicidní přípravek, který jako regulátor růstu a vývoje hmyzu negativně ovlivňuje svlékání muších larev tak, že nedojde k jejich přeměně v kuklu a dospělce. Nezabíjí dospělé mouchy. K eliminaci dospělců mouchy dochází postupně a viditelná je po dvou týdnech po aplikaci přípravku. Pro zajištění rychlejší redukce dospělé muší populace se doporučuje současné použití přípravků likvidujících dospělé mouchy. Působí v podestýlce, hnoji, kejdě i ve fermentujících zbytcích krmiv.

Návod k použití

Neporex 2 SG jsou ve vodě rozpustné granule, které se aplikují přímo suché, nebo po rozpuštění ve vodě kropením, nebo postřikem ručními i motorovými postřikovači. Doporučená dávka je 0,5 g účinné látky na m², nezávisle na způsobu aplikace. Pro bližší informace si přečtěte přiložený návod k použití!

Bezpečnostní list je k dispozici pro odborně způsobilé uživatele.

Neporex 2 SG je určen pro profesionální použití včetně farmářů.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Bezpečnostní opatření pro osobu manipulující s přípravkem

Vždy se řiďte opatřeními pro minimalizaci expozice pracovníka.

Při práci je nutno se vyvarovat požití, nadýchání a potřísnění pokožky, očí a oděvu.

Při aplikaci je nutno používat ochranné rukavice pokud aplikujete suché granule. Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po skončení práce je nutno se důkladně omýt a převléci se. V případě náhle vzniklé nevolnosti, okamžitě přestaňte pracovat s přípravkem a konzultujte s lékařem. Při nadýchání se přesuňte na čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s pokožkou ji omyjte vodou a mýdlem. Při kontaktu s očima: Oči vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Vypláchněte ústa vodou a vypijte velké množství vody.

Antidotum

Není známo specifické antidotum.

Terapii případné otravy je možno konzultovat s **Toxikologickým informačním střediskem v Praze, Na Bojišti 1, Praha 2, tel: 224 91 92 93 a 224 91 54 02.**

Obecná doporučení

Zabraňte kontaminaci žlabů a napáječek. Nesplachujte do povrchových vod nebo kanalizace.

Velikost balení:

1kg, 5kg

Likvidace obalů a zbytků:

Prázdné obaly a zbytky přípravku se předají ke spálení ve schválené spalovně pro chemikálie.
Viz: speciální pokyny/ bezpečnostní list

Skladování:

Uchovávejte mimo dosahu dětí.

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech při teplotě od 2°C do 30°C.

Chraňte před světlem a vlhkem.

Skladujte odděleně od krmiv, potravin a stimulantů.

Odpovědnost:

Uživatel plně odpovídá za škody, které byly zapříčiněny faktory, které výrobce nemůže ovlivnit. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným skladováním nebo použitím přípravku.

OSOBA ZODPOVĚDNA ZA UVADĚNÍ NA TRH V ČR

Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Německo

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE POZORNĚ PŘILOŽENÝ DETAILNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍPRAVKU NEPOREX 2SG!

H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103	Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501	Odstraňte obsah/ obal předáním schválené spalovně odpadů.

Číslo šarže:

Datum výroby:

Datum expirace:

NAVODILO

Neporex 2 SG

Neporex 2 SG jsou ve vodě rozpustné granule, které se aplikují přímo suché, nebo po rozpuštění ve vodě kropením, nebo postřikem ručními i motorovými postřikovači. Doporučená dávka je 0,5g účinné látky na m², nezávisle na způsobu aplikace.

Aplikace suchých granulí posypem: Aplikujte Neporex 2 SG přímo a rovnoměrně tam kde mouchy kladou vajíčka a kde dochází k vývinu larev. Suché granule sypte pouze na kejdu nebo močůvku.

Aplikace rozprašováním: Důkladně zamíchejte určené množství přípravku Neporex 2 SG s odpovídajícím množstvím vody. Aplikujte tam, kde mouchy kladou vajíčka a kde dochází k vývinu larev. K aplikaci použijte zádový postřikovač nebo motorový postřikovač.

Aplikace kropením: Důkladně zamíchejte určené množství přípravku Neporex 2 SG s odpovídajícím množstvím vody. Aplikujte tam, kde mouchy kladou vajíčka a kde dochází k vývinu larev. K aplikaci použijte konev.

Obecná doporučení: Před aplikací přípravku najděte všechna líníště much současně. Neporex 2 SG se aplikuje pouze na místa, kde mouchy kladou vajíčka a kde dochází k vývinu larev. Nástraha se neaplikuje na místa, která jsou mouchami vyhledávána jako sedací plochy (stěny, stropy atd.), neúčinkuje na dospělé jedince.

Interval ošetření: Interval ošetření je závislý na managementu a typu chovu a také na klimatických podmínkách. Pohybuje se od 2-3 týdnů do několika měsíců. Přesnější doporučení jsou uvedeny níže v návodu k použití:

1. obrázek

Skot	Množství přípravku Neporex 2 SG pro ošetření pásu o velikosti 20mx50cm (10m ²)	
Hluboká podestýlka: Ošetřete v pásích o šíři cca 50 cm místa podél stěn, vedle nebo pod instalacemi, kde není podestýlka sešlapaná zvířaty, ošetřete okrajová místa a místa pod žlaby a napáječkami, kde dochází ke kumulaci hnoje.	Aplikace kropením	Aplikace rozprašováním
Venkovní přístřešky pro skot, ošetřete celou plochu. Opakujte ošetření po každém vyčištění, nebo pokaždé, když najdete muší larvy. Aplikujte Neporex 2 SG kropením nebo rozprašováním přibližně 3 dny po vyčištění a opakujte ošetření po každém vyskladnění nebo pokud objevíte larvy much.	250 g/7,5 litrů vody	250 g/2,5 litrů vody

2. obrázek

Skot na roštích: Ošetřete rovnoměrně celou podlahu okamžitě po vyčištění hnojiště. Opakujte ošetření po každém vyčištění, nebo pokud najdete muší larvy.	Množství Neporexu 2 SG pro ošetření 10 m² plochy Aplikace suchých granulí posypem 250 g
--	---

3. obrázek

Prasata			
Celoroštové podlahy: Ošetřete celou plochu podlahy okamžitě po vyčištění hnojiště. Opakujte ošetření po každém vyčištění, nebo pokud najdete muší larvy.	Množství Neporexu 2 SG pro ošetření 10 m² plochy		
Systém vše ven - vše dovnitř (all-in-all-out): Aplikujte rozprašováním a ošetřujte prázdné kotce ihned po vyčištění, nejlépe před naskladněním mezi jednotlivými turnusy.	Aplikace suchých granulí posypem	Aplikace kropením	Aplikace rozprašováním
Hluboká podestýlka: Aplikujte kropením nebo rozprašováním a ošetřete přibližně 3 dny po odstranění podestýlky a opakujte ošetření po každém vyskladnění a nebo pokud najdete muší larvy. Ošetřete celou plochu podestýlky a vlhká místa v okolí žlabů a napáječek.	250 g	250 g/7,5 litrů vody	250 g/2,5 litrů vody

4. obrázek

Drůbež	Množství Neporexu 2 SG pro ošetření 10 m² plochy		
Ošetřete přípravkem Neporex 2 SG celé trusné zařízení včetně jímek, přibližně 1 týden po odstranění hnoje. Opakujte po každém vyskladnění a nebo pokud najdete muší larvy.	Vlhká podestýlka	Suchá podestýlka	
	Aplikace suchých granulí posypem	Aplikace kropením	Aplikace rozprašováním
	250 g	250 g/7,5 litrů vody	250 g/2,5 litrů vody

Ostatní zemědělské objekty:

Obecně se Neporex 2 SG aplikuje na místa, kde mouchy kladou vajíčka a kde dochází k vývinu larev po 1 - 3 denním navrstvení materiálu. Druhé ošetření se provádí po 2 týdnech. Neporex 2 SG nepůsobí na dospělé mouchy. Pro okamžitou likvidaci dospělých much je třeba kombinovat ošetření Neporex 2 SG s přípravky působícími na dospělé hmyz.