



Elanco

Elanco Nagyállat Termékkatalógus *Magyarország*

Az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak. ©2021 Elanco és leányvállalatai. PM-HU-21-0264



Elanco


Termékek

	Agita®	05
Amoksiklav®	Amoksiklav® 62,5%	06
Amoxysol® LA	Amoxysol® LA	07
	Arentor DC™ 250 mg	08
	Baycox® Iron	09
	Baycox® Multi 50 mg/ml	10
Baytril®	Baytril® 5 mg/ml	11
Baytril®	Baytril® 50 mg/ml	12
Baytril®	Baytril® 100 mg/ml	14
Baytril® Max	Baytril® Max 100 mg/ml	16
Catosal®	Catosal®	17
Ceffect® 2.5%	Ceffect® 2,5%	18
Ceffect® LC	Ceffect® LC 75 mg	20
	Coliprotec®	21
	Denagard® 10% inj	22
	Denagard® 20% inj	23
	Denagard® 100 mg/g Premix 25 kg	24
	Denagard® 45% WSG	25
	Flubenol™ 50 mg/g gyógypremix	26
	Glutellac®	27
	Increxxa™	28
	Kexxtone™	29
	Pulmotil™ 200 mg/g Premix	30
	RespiSure™ One	31
Sebacil®	Sebacil	32
	Stresnil™	33
Tardocyclin® spray A.U.V.	Tardocyclin	34
	Tylan™ 100 mg/g premix	35

Útitérkép az Elanco sertés- és szarvasmarha-termékeinek használatához




Gyors áttekintés, amely segít meghatározni, hogy a **sertések** és a szarvasmarhák számára kifejlesztett legfontosabb termékeink az állatok életciklusának mely szakaszában használhatók.



Útitérkép az Elanco sertés- és szarvasmarha-termékeinek használatához



Gyors áttekintés, amely segít meghatározni, hogy a sertések és a **szarvasmarhák** számára kifejlesztett legfontosabb termékeink az állatok életciklusának mely szakaszában használhatók.



Agita® 10WG légyirtó kenőanyag.



➤ Hatóanyag

Tiametoxám és trikozén

➤ Célorganizmus

Musca domestica (házi légy) kifejlett egyedek (imágók)

➤ Felhasználási terület

Az Agita® 10WG az istállózó állattenyésztésben (beleértve a baromfi, sertés, szarvasmarha tartást, istállókat, állatkezelő és tartó létesítményeket, és egyéb ezekkel összefüggő épületeket, ahol a legyek irtása szükséges) a kifejlett legyek (imágók) irtására alkalmas készítmény.

➤ Adagolás és alkalmazás módja

- Beltéri.
- A terméket kizárólag függesztett kartonlapokra kenve lehet alkalmazni.
- 100 g terméket 80 ml vízben kell elkeverni.
- Az elkevert terméket ecsettel vagy hengerrel kenjük fel 10 db 20 cm x 30 cm nagyságú kartonlapra.
- 80-120 négyzetméternyi falfelületre jusson 10 kezelt kartonlap.
- Négy hetet is igénybe vehet, míg a termék hatása érvényesül.
- Amennyiben az irtószer ismételt alkalmazása szükséges, a két kezelés között legalább 6 hétnek kell eltelnie, ennél gyakrabban az irtószer nem használható.

➤ Kiszerelés

Kiszerelés: műanyag (HDPE)
flakon 100 g – 5 kg
25 db 20 grammos műanyag nyomtatott
többrétegű zacskó, kartondobozban.

➤ Felhasználói kör

Lakossági (nem foglalkozásszerű)



A termékfotó szimbolikus.

Link és QR-kód a készítmény
jellemzőinek összefoglalója:



Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!



Amoksiklav 62,5% por belsőleges oldathoz A.U.V.



➤ **Hatóanyag (100 g por tartalmaz)**

Amoxicillin (amoxicillin-trihidrát formában) 50,0 g
Klavulánsav (kálium-klavulanát formában) 12,5 g

➤ **Célállat faj**

Sertés

➤ **Javallatok:**

Sertések amoxicillin-klavulánsav kombinációra érzékeny kórokozók, főként *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *E. coli* és *Streptococcus suis* okozta légzőszervi, emésztőszervi, bőr- és lágszöveti fertőzéseinek gyógykezelésére.

➤ **Adagolás és alkalmazási mód**

Ivóvízbe keverve kell alkalmazni. Közvetlenül a felhasználás előtt készítsük el a friss oldatot.

- Naponta kétszer 2 g Amoksiklav 62,5 % por belsőleges oldathoz/100 ttkg (ez a dózis 1 g amoxicillinnek, illetve 250 mg klavulánsavnak felel meg). A kezelést 5 napig kell folytatni.
- A víztiszta oldat elkészítéséhez 20 g port minimum 7 liter vízben kell feloldani. A szükséges gyógyszer mennyiséget kevés, langyos (legfeljebb 25 °C-os) vízben oldjuk fel és keverjük jól el, majd keverés közben adjuk hozzá a többi vizet a teljes feloldódásig. Az elkészített gyógyszeres ivóvíz 24 órán belül felhasználandó.

➤ **Élelmezés-egészségügyi várakozási idő**

1 nap

➤ **Kiszerelés**

500 g


➤ **Elérhető**

Csak állatorvosi rendelvényre



A termékfotó szimbolikus.





Amoxysol LA 150 mg/ml szuszpenziós injekció A.U.V.



Hatóanyag

Amoxicillin (trihidrát formában) 150 mg

Célállatfaj

Szarvasmarha, sertés, juh

Javallatok

Az Amoxysol LA 150 mg/ml szuszpenziós injekció szarvasmarhák, sertések és juhok részére A.U.V. használata különösen alkalmas olyan esetekben, amikor egyetlen injekcióval kiváltható, tartós antibakteriális hatásra van szükség. Szarvasmarha, sertés, juh: amoxicillinre érzékeny kórokozók (*Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus* spp., *Salmonella* spp., *Staphylococcus* spp. és *Streptococcus* spp.) által okozott gyomor-bél fertőzések, légzőszervi betegségek, urogenitális fertőzések, bőr- és lágyrészi fertőzések kezelésére.

Adagolás és alkalmazási mód

Csak intramuszkuláris injekcióval alkalmazandó.

A javasolt dózis: 15 mg/ttkg. A dózis térfogata egyenértékű 1 ml/10 ttkg-mal.

- Szükség esetén a kezelés 48 óra múlva megismételhető. Az egymás utáni 2 injekciót két különböző helyre javasolt beadni. A helyes adagolás biztosítása és az aluldozózás elkerülése érdekében a testtömeget a lehető legpontosabban meg kell határozni.
- Ha a dózis térfogata meghaladja a 15 ml-t szarvasmarha és 4 ml-t juh és sertés esetében, akkor a dózist több részletben, két vagy több helyre kell beadni. Alkalmazás előtt alaposan fel kell rázni.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő(k)

Szarvasmarha: Hús és egyéb ehető szövetek: 39 nap. Tej: 108 óra (4,5 nap)

Sertés: Hús és egyéb ehető szövetek: 42 nap

Juh: Hús és egyéb ehető szövetek: 29 nap


A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő juhoknál nem engedélyezett.

Kiszereles:

100 ml-es üveg

Elérhető

Csak állatorvosi rendelvényre



A termékfotó szimbolikus.



Arentor DC 250 mg intramammalis szuszpenzió.



➤ **Hatóanyag**

Cefalonium 250 mg
(cefalonium-dihidrát formájában)

➤ **Célállat faj(ok)**

Szarvasmarha (szárazonálló tehen)

➤ **Javallatok**

Szárazra állításkor a már fennálló szubklinikai tügyfertőzések kezelésére, valamint a szárazonállás alatt cefaloniumra érzékeny *S. aureus*, *S. agalactiae*, *S. dysgalactiae*, *S. uberis*, *Trueperella pyogenes*, *E. coli* és *Klebsiella* spp. okozta új bakteriális tügyfertőzésekkel szembeni védelem céljából.

➤ **Adagolás és alkalmazási mód**

- Intramammalis alkalmazásra. Az intramammalis fecskendőt csak egyszer szabad használni. Minden egyes tügynegyed bimbócsatornájába egy intramammalis fecskendő tartalmát kell beadni közvetlenül az utolsó laktációs fejés után.
- 1. lehetőség: Intramammalis beadás rövid adagolófejjel.
- 2. lehetőség: Intramammalis beadás teljes hosszúságú adagolófejjel.

➤ **Élelmezés-egészségügyi várakozási idő(k)**

Hús és egyéb ehető szövetek: 21 nap

Tej: az ellés után 96 óra, ha a szárazonállási időszak hosszabb, mint 54 nap; a kezelés után 58 nap, ha a szárazonállási időszak 54 napos vagy annál rövidebb.

➤ **Kiszerelek**

20 db intramammalis fecskendő

➤ **Elérhető**

Csak állatorvosi rendelvényre



A termékfotó szimbolikus.





Baycox Iron szuszpenziós injekció.



➤ **Hatóanyagok (1 ml tartalmaz)**

Toltrazuril 36,4 mg, Vas (III) 182 mg,
(gleptoferron formában 484,7 mg)

➤ **Célállat fajok**

Sertés (malac, születés után 48-72 órával)

➤ **Javallatok**

A kokcidiózis klinikai tüneteinek (mint a hasmenés) megelőzésére újszülött malacokban *Cystoisospora suis*-szal bizonyítottan fertőzött gazdaságokban és a vashiányos anémia megelőzésére.

➤ **Adagolás és alkalmazási mód**

- Intramuszkuláris alkalmazás. A javasolt beadási hely a nyak környéke.
- Az állatgyógyászati készítményt malacoknál a születést követő 48-72 órán belül kell alkalmazni, egyszeri intramuszkuláris injekció formájában 20 mg toltrazuril/testtömeg-kg és 100 mg vas (gleptoferron formában)/testtömeg-kg dózisban, ami 0,55 ml/testtömeg-kg dózist jelent a készítményből.
- A megfelelő adag megállapítása érdekében a malacok testtömegét a lehető legpontosabban kell meghatározni.

➤ **Élelmezés-egészségügyi várakozási idő**

Hús és egyéb ehető szövetek: 53 nap

➤ **Kiszerelés**

100 ml-es üveg

➤ **Elérhető**

Kizárólag állatorvosi vényre adható ki



A termékfotó szimbolikus.

Link és QR-kód: a készítmény jellemzőinek összefoglalója



Tk.sz. Baycox Iron 36 mg/ml + 182 mg/ml szuszpenziós injekció malacok részére A.U.V.: EU/2/19/239/001. A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer Animal Health GmbH (Elanco company). Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Elanco képviselőt: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

Az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak. A Baycox terméket az Elanco vagy leányvállalatai forgalmazzák, nem a Bayer terméke. A Baycox márkanév a Bayer tulajdona és használata licenzhez kötött. A Bayer és a Bayer kereszt a Bayer védjegye. ©2021 Elanco és leányvállalatai.

©2021 Elanco Animal Health. PM-HU-21-0226

Elanco



Baycox Multi 50 mg/ml belsőleges szuszpenzió.



- **Hatóanyag**
Toltrazuril 50 mg
- **Célállat fajok**
Szarvasmarha, sertés, juh
- **Javallatok, adagolás és az alkalmazás módja**

A termékfotó szimbolikus.



SZARVASMARHA Jövőbeli tejtermelésre szánt BORJAK, húshasznú BORJAK, tejhasznú fajták intenzív hizlalásra szánt BIKABORJAI

Javallatok	Borjakban a kokcidiózis klinikai tüneteinek megelőzésére és a kokcidiumürítés csökkentésére <i>Eimeria bovis</i> vagy <i>Eimeria zuernii</i> által bizonyítottan fertőzött telepeken.
Adagolás	Egyedi, egyszeri adagja szájon át 15 mg toltrazuril/testtömeg-kg, ami megfelel 3,0 ml szuszpenzióknak 10 testtömeg-kilogrammonként.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő
Hús: 63 nap

Azonos fajtájú és azonos vagy hasonló korú állatcsoport kezelésekor az adagolást a csoport legnehezebb állatához kell mérni.

SERTÉS MALAC (3-5 napos)

Javallatok	3-5 napos malacokban a kokcidiózis klinikai tüneteinek megelőzésére <i>Cystoisospora suis</i> -szal bizonyítottan fertőzött gazdaságokban.
Adagolás	A 3-5 napos malacok egyedi, egyszeri adagja szájon át 20 mg toltrazuril/testtömeg-kg, ami megfelel 0,4 ml szuszpenzióknak testtömeg-kilogrammonként. A kis mennyiségek alkalmazása miatt 0,1 ml-es pontosságú adagolóeszköz használata javasolt.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő
Hús: 77 nap

JUH BÁRÁNY

Javallat	Bárányokban a kokcidiózis klinikai tüneteinek megelőzésére, valamint a kokcidiumürítés csökkentésére <i>Eimeria crandallis</i> vagy <i>Eimeria ovinoidalis</i> által bizonyítottan fertőzött állományokban.
Adagolás	Egyedi, egyszeri adagja szájon át 20 mg toltrazuril/testtömeg-kg, ami megfelel 0,4 ml szuszpenzióknak testtömeg-kilogrammonként

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő
Hús: 42 nap

Ha az állatokat inkább együtt, mint egyedenként kezelik, akkor az állatokat testtömeg szerint csoportosítani kell az alul- vagy felüldozírozás elkerülése érdekében.

- **Tej:** A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő teheneknél és juhoknál nem engedélyezett.

➤ Kiszerezés

250 ml és 1000 ml flakon

➤ Elérhető

Csak állatorvosi rendelvényre

Link és QR-kód: a készítmény jellemzőinek oszlopai



Tk.sz. Baycox Multi 50 mg/ml belsőleges szuszpenzió szarvasmarhák, sertések és juhok részére A.U.V.: 3826/1/16 NÉBIH ÁTI (100 ml), 3826/2/16 NÉBIH ÁTI (250 ml), 3826/3/16 NÉBIH ÁTI (1000 ml). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer Animal Health GmbH (Elanco company). Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Elanco képviselőt: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

Az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak. A Baycox terméket az Elanco vagy leányvállalatai forgalmazzák, nem a Bayer terméke. A Baycox márkanév a Bayer tulajdona és használata licenszhez kötött. A Bayer és a Bayer kereszt a Bayer védjegye. ©2021 Elanco és leányvállalatai. PM-HU-21-0225

Elanco



Baytril 5 mg/ml belsőleges oldat. ✨

➤ **Hatóanyag**

Enrofloxacin 5,0 mg/ml

➤ **Célállat faj**

Sertés (malac)

➤ **Javallatok**

Malacok alább felsorolt enrofloxacinra érzékeny Gram-pozitív, Gram-negatív baktériumok és mycoplasmák által okozott légző- és emésztőszervi fertőzései, valamint multifaktoriális megbetegedései (pl. enzootiás tüdőgyulladás, torzító orrgyulladás) kezelésére: *Pasteurella multocida*, *Escherichia coli* (szeptikémiás forma is), *Mycoplasma hyopneumoniae*.

➤ **Adagolás és alkalmazási mód**

Alkalmazás módja: szájon át.

- A készítmény napi adagja: 1,7 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml Baytril 5 mg/ml belsőleges oldat/3 ttkg-nak.
- Felhasználási javaslat:
Használjuk a mellékelt adagolót. A kinyitáshoz fordítsuk a felső adagoló részt az óramutató járásával ellenkező irányba.
Egy nyomás 1 ml-t adagol (= 5 mg enrofloxacin).
A kezelés időtartama: 2-3 egymást követő nap.

➤ **Élelmezés-egészségügyi várakozási idő**

Hús és egyéb ehető szövetek: 10 nap

➤ **Kiszerelés**

100 ml-es flakon


➤ **Elérhető**

Kizárólag állatorvosi vényre adható ki



A termékfotó szimbolikus.





Baytril 50 mg/ml oldatos injekció A.U.V. ✨

➤ **Hatóanyag**

Enrofloxacin 50 mg

➤ **Célállat fajok**

Szarvasmarha (borjú), juh, kecske, sertés

➤ **Javallat, adagolás és az alkalmazás módja**



A termékfotó szimbolikus.

BORJÚ Javallat	Kórokozó	Adagolás és az alkalmazás módja	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő
Légzőszervi fertőzések	<i>Pasteurella multocida</i> <i>Mannheimia haemolytica</i> <i>Mycoplasma</i> spp.	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/10 ttkg-nak, naponta egyszer, 3-5 napig, SC vagy IV	Borjak IV: hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap SC: hús és egyéb ehető szövetek: 12 nap*
Emésztőszervi fertőzések	<i>E. coli</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/10 ttkg-nak, naponta egyszer, 3-5 napig, SC vagy IV	Borjak IV: hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap SC: hús és egyéb ehető szövetek: 12 nap*
Szeptikémia	<i>E. coli</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/10 ttkg-nak, naponta egyszer, 3-5 napig, SC vagy IV	Borjak IV: hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap SC: hús és egyéb ehető szövetek: 12 nap*
Ízületgyulladással társult akut mikoplazmózis	<i>Mycoplasma bovis</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/10 ttkg-nak, naponta egyszer, 5 napig, SC vagy IV	Borjak IV: hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap SC: hús és egyéb ehető szövetek: 12 nap*

*A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejtermelő állatoknál nem engedélyezett.

JUH Javallat	Kórokozó	Adagolás és az alkalmazás módja	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő
Emésztőszervi fertőzések	<i>E. coli</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/10 ttkg-nak, naponta egyszer, 3 napig, SC	Hús és egyéb ehető szövetek: 4 nap Tej: 3 nap
Szeptikémia	<i>E. coli</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/10 ttkg-nak, naponta egyszer, 3 napig, SC	Hús és egyéb ehető szövetek: 4 nap Tej: 3 nap
Masztitisz	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>E. coli</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/10 ttkg-nak, naponta egyszer, 3 napig, SC	Hús és egyéb ehető szövetek: 4 nap Tej: 3 nap

➤ **Kiszerezés**

100 ml-es üveg


➤ **Elérhető**

Csak állatorvosi rendelvényre



Link és QR-kód: a készítmény jellemzőinek összefoglalója

Az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak. A Baytrilt az Elanco vagy leányvállalatai forgalmazzák, nem a Bayer terméke. A Baytril márkanév a Bayer tulajdona és használata licenzhez kötött. A Bayer és a Bayer kereszt a Bayer védjegye. ©2021 Elanco és leányvállalatai. PM-HU-21-0233



Baytril 50 mg/ml oldatos injekció A.U.V. ✨



A termékfotó szimbolikus.

➤ Javallat, adagolás és az alkalmazás módja

KECSKE Javallat	Kórokozó	Adagolás és az alkalmazás módja	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő
Légzőszervi fertőzések	<i>Pasteurella multocida</i> , <i>Mannheimia haemolytica</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/10 ttkg SC injekciónak, naponta egyszer, 3 napig	Hús és egyéb ehető szövetek: 6 nap Tej: 4 nap
Emésztőszervi fertőzések	<i>E. coli</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/10 ttkg SC injekciónak, naponta egyszer, 3 napig	Hús és egyéb ehető szövetek: 6 nap Tej: 4 nap
Masztitisz	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>E. coli</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/10 ttkg SC injekciónak, naponta egyszer, 3 napig	Hús és egyéb ehető szövetek: 6 nap Tej: 4 nap
Szeptikémia	<i>E. coli</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/10 ttkg SC injekciónak, naponta egyszer, 3 napig	Hús és egyéb ehető szövetek: 6 nap Tej: 4 nap

SERTÉS Javallat	Kórokozó	Adagolás és az alkalmazás módja	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő
Légzőszervi fertőzések	<i>Pasteurella multocida</i> , <i>Mycoplasma spp.</i> , <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>	2,5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 0,5 ml/10 ttkg készítménynek, naponta egyszer, IM injekcióban, 3 napig	Hús és egyéb ehető szövetek: 13 nap
Emésztőszervi fertőzések	<i>E. coli</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/10 ttkg SC injekciónak naponta egyszer, 3 napig	Hús és egyéb ehető szövetek: 13 nap
Szeptikémia	<i>E. coli</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/10 ttkg SC injekciónak naponta egyszer, 3 napig	Hús és egyéb ehető szövetek: 13 nap

➤ Kiszerelés

100 ml-es üveg

➤ Elérhető

Csak állatorvosi rendelvényre


Link és QR-kód: a készítmény jellemzőinek összefoglalója



Tk.sz. Baytril 50 mg/ml oldatos injekció A.U.V.: 3255/1/12 NÉBIH ÁTI (100 ml), 3255/2/12 NÉBIH ÁTI (50 ml). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer Animal Health GmbH (Elanco company). Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze az Elanco képviselőjét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

Az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak. A Baytrilt az Elanco vagy leányvállalatai forgalmazzák, nem a Bayer terméke. A Baytril márkanév a Bayer tulajdona és használata licenzhez kötött. A Bayer és a Bayer kereszt a Bayer védjegye. ©2021 Elanco és leányvállalatai. PM-HU-21-0233





Baytril 100 mg/ml oldatos injekció A.U.V.

➤ **Hatóanyag**

Enrofloxacin 100 mg

➤ **Célállat fajok**

Szarvasmarha (borjú), juh, kecske, sertés

➤ **Javallat, adagolás és az alkalmazás módja**



A termékfotó
szimbolikus.

SZARVASMARHA

Javallat	Kórokozók	Adagolás és az alkalmazás módja
Légzőszervi fertőzések	<i>Pasteurella multocida</i> , <i>Mannheimia haemolytica</i> , <i>Mycoplasma</i> spp.	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg készítménynek, naponta egyszer, 3-5 napig, SC vagy IV
Heveny, súlyos masztitisz	<i>E. coli</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg készítménynek, naponta egyszer, 2 napig, IV
Emésztőszervi fertőzések	<i>E. coli</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg készítménynek, naponta egyszer, 3-5 napig, SC vagy IV
Szeptikémia	<i>E. coli</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg készítménynek, naponta egyszer, 3-5 napig, SC vagy IV
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	IV adagolást követően: Hús és egyéb ehető szövetek 5 nap, tej 3 nap SC adagolást követően: Hús és egyéb ehető szövetek 12 nap, tej 4 nap	

SZARVASMARHA < 2 éves

Javallat	Kórokozók	Adagolás és az alkalmazás módja
Heveny mikoplazmózis	<i>Mycoplasma bovis</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg készítménynek, naponta egyszer, 5 napig, SC vagy IV
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	IV adagolást követően: Hús és egyéb ehető szövetek 5 nap, tej 3 nap SC adagolást követően: Hús és egyéb ehető szövetek 12 nap, tej 4 nap	

JUH

Javallat	Kórokozók	Adagolás és az alkalmazás módja
Emésztőszervi fertőzések	<i>E. coli</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg készítménynek, naponta egyszer, 3 napig, SC
Szeptikémia	<i>E. coli</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg készítménynek, naponta egyszer, 3 napig, SC
Masztitisz	<i>Staphylococcus aureus</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg készítménynek, naponta egyszer, 3 napig, SC


➤ **Élelmezés-egészségügyi várakozási idő** Hús és egyéb ehető szövetek: 4 nap | Tej: 3 nap

➤ **Kiszerelés**

100 ml-es üveg

➤ **Elérhető**

Csak állatorvosi rendelvényre



Baytril 100 mg/ml oldatos injekció A.U.V.

➤ **Hatóanyag**

Enrofloxacin 100 mg

➤ **Célállat fajok**

Szarvasmarha (borjú), juh, kecske, sertés

➤ **Javallat, adagolás és az alkalmazás módja**

KECSKE		
Javallat	Javallat	Adagolás és az alkalmazás módja
Légzőszervi fertőzések	<i>Pasteurella multocida</i> , <i>Mannheimia haemolytica</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg készítménynek, naponta egyszer, 3 napig, SC
Emésztőszervi fertőzések	<i>E. coli</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg készítménynek, naponta egyszer, 3 napig, SC
Szeptikémia	<i>E. coli</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg készítménynek, naponta egyszer, 3 napig, SC
Masztitisz	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>E. coli</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg készítménynek, naponta egyszer, 3 napig, SC
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Hús és egyéb ehető szövetek: 6 nap Tej: 4 nap	
SERTÉS		
Javallat	Javallat	Adagolás és az alkalmazás módja
Légzőszervi fertőzések	<i>Pasteurella multocida</i> , <i>Mycoplasma</i> spp., <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>	2,5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 0,5 ml/20 ttkg készítménynek, naponta egyszer, 3 napig, IM
Húgyszervi fertőzések	<i>E. coli</i>	2,5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 0,5 ml/20 ttkg készítménynek, naponta egyszer, 3 napig, IM
Ellés utáni csökkent tejtermelés (PDS, MMA szindróma)	<i>E. coli</i> , <i>Klebsiella</i> spp.	2,5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 0,5 ml/20 ttkg készítménynek, naponta egyszer, 3 napig, IM
Emésztőszervi fertőzések	<i>E. coli</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg készítménynek, naponta egyszer, 3 napig, IM
Szeptikémia	<i>E. coli</i>	5 mg enrofloxacin/ttkg, ami megfelel 1 ml/20 ttkg készítménynek, naponta egyszer, 3 napig, IM

➤ **Élelmezés-egészségügyi várakozási idő**

Hús és egyéb ehető szövetek: 13 nap

➤ **Kiszerelés**

100 ml-es üveg


➤ **Elérhető**

Csak állatorvosi rendelvényre

Link és QR-kód: a készítmény jellemzőinek összefoglalója



Tk.sz. Baytril 100 mg/ml oldatos injekció A.U.V.: 2545/1/09 MgSzH ÁTI (50 ml), 2545/2/09 MgSzH ÁTI (100 ml). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer Animal Health GmbH (Elanco company). Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze az Elanco képviselőjét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.
Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com



BAYTRIL Max oldatos injekció A.U.V.



➤ **Hatóanyag**

Enrofloxacin 100 mg

➤ **Célállat fajok**

Szarvasmarha, sertés

➤ **Javallat, adagolás és az alkalmazási mód**



A termékfotó szimbolikus.

Állatfaj	Javallat	Kórokozók	Adagolás és az alkalmazási mód	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő
SZARVAS-MARHA	Légzőszervi betegség	<i>Pasteurella haemolytica</i> , <i>Pasteurella multocida</i> , <i>Haemophilus sommus</i> and <i>Mycoplasma</i> spp.	Napi 7,5 mg enrofloxacin/testtömeg-kg (s.c.), amely a Baytril Max injekcióból 7,5 ml/100 ttkg mennyiségnek felel meg. Egyszeri kezelés (s.c.) általában elegendő, súlyos esetekben 24 óra múlva meg kell ismételni	Hús és egyéb ehető szövetek: 14 nap Tej: 72 óra (6 fejés)
SZARVAS-MARHA	Tőgygyulladás	<i>E. coli</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i>	Napi 5,0 mg enrofloxacin/testtömeg-kg (i.v.), amely a Baytril Max injekcióból 5 ml/100 ttkg mennyiségnek felel meg, 2 napig (i.v.) kell kezelni	Hús és egyéb ehető szövetek: 14 nap Tej: 72 óra (6 fejés)
SERTÉS	Légzőszervi megbetegedés	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> , <i>Mycoplasma hyopneumoniae</i> , <i>Pasteurella multocida</i> , <i>Haemophilus parasuis</i> , <i>Streptococcus suis</i> és <i>Bordetella bronchiseptica</i>	Napi 7,5 mg enrofloxacin/testtömeg-kg (s.c.), amely a Baytril Max injekcióból 7,5 ml/100 ttkg mennyiségnek felel meg, egyszeri kezelés (s.c.) általában elegendő	Hús és egyéb ehető szövetek: 10 nap

➤ **Kiszerelés**

100 ml-es üveg

➤ **Elérhető**

Csak állatorvosi rendelvényre


Link és QR-kód: a készítmény jellemzőinek összefoglalója



Tk.sz. Baytril® Max oldatos injekció szarvasmarhának és sertésnek A.U.V.: 2504/1/09 MgSzH ÁTI (100 ml). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer Animal Health GmbH (Elanco company). Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze az Elanco képviselőjét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

Az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak. A Baytril-t az Elanco vagy leányvállalatai forgalmazzák, nem a Bayer terméke. A Baytril márkanév a Bayer tulajdona és használata licenzhez kötött. A Bayer és a Bayer kereszt a Bayer védjegye. ©2021 Elanco és leányvállalatai. PM-HU-21-0236





Catosal oldatos injekció A.U.V.



➤ **Hatóanyagok**

Butafoszfán 100 mg, cianokobalamin 0,05 mg

➤ **Célállat fajok**

Szarvasmarha, kutya, macska, prémes állatok

➤ **Javallatok**

Tápanyaghiányok vagy betegségek okozta anyagforgalmi rendellenességek kezelésére, a meddőség és az ellést követő megbetegedések kiegészítő kezelésére. Tetánia és paresis esetén a kalcium- és magnézium-terápia kiegészítésére. Egészséges állatokban felhasználható az izmok teljesítőképességének fokozására.

➤ **Adagolás és alkalmazási mód**

Alkalmazási mód: szubkután, intramuszkuláris, intravénás. Kifejlett szarvasmarha: intravénás, intramuszkuláris.

Adagolás: a kezelendő esettől függően:

Kifejlett szarvasmarha: 10,0 – 25,0 ml (im., iv.)

Borjú: 5,0 – 12,0 ml (iv., im.)

Kutya: 0,5 – 5,0 ml (im., sc., iv.)

Macska, prémes állatok: 0,5 – 2,5 ml (im., sc., iv.)

Szükség esetén naponta ismételhető.

➤ **Élmezés-egészségügyi várakozási idő**

Szarvasmarha: hús és egyéb ehető szövetek - Nulla nap. | **Tehéntej:** nulla nap

➤ **Kiszerezés**

100 ml-es üveg

➤ **Elérhető**

Csak állatorvosi rendelvényre



A termékfotó szimbolikus.





Ceffect 25 mg/ml szuszpenziós injekció.



➤ **Hatóanyag**

Cefkvinom (szulfát formájában) 25 mg/ml

➤ **Célállat fajok**

Szarvasmarha, sertés

➤ **Javallat, adagolás és az alkalmazás módja**

Az összes kezelést intramuszkuláris injekcióban kell beadni.

A termékfotó szimbolikus.



SZARVASMARHA

Javallat

Pasteurella multocida és *Mannheimia haemolytica* által okozott légzőszervi megbetegedések kezelésére. Dermatitis digitalis, fertőző csülök-nekrobacillózis és akut interdigitális nekrobacillózis (panarícium, „bűdös sántaság”) kezelésére

Akut, szisztémás tünetekkel járó *E. coli* masztitisz kezelésére

Adagolás

1 mg cefkvinom/ttkg (2 ml/50 ttkg) naponta egyszer, 3 vagy 5 egymást követő napon át

1 mg cefkvinom/ttkg (2 ml/50 ttkg) naponta egyszer, 2 egymást követő napon át

BORJÚ

Javallat

E. coli septicémia

Adagolás

2 mg cefkvinom/ttkg (4 ml/50 ttkg) naponta egyszer, 3 vagy 5 egymást követő napon át

SERTÉS

Javallat

Pasteurella multocida, *Haemophilus parasuis*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Streptococcus suis* és más, cefkvinomra érzékeny baktériumok által okozott légzőszervi betegségek kezelésére.

MMA szindróma (melynek kialakulásában szerepet játszanak a következő baktériumfajok: *E. coli*, *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. és egyéb, cefkvinomra érzékeny kórokozók)

Adagolás

2 mg cefkvinom/ttkg (2 ml/25 ttkg) naponta egyszer, 3 egymást követő napon át

2 mg cefkvinom/ttkg (2 ml/25 ttkg) naponta egyszer, 2 egymást követő napon át

➤ **Élelmezés-egészségügyi várakozási idők**

Szarvasmarha: Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap | **Tej:** 24 óra

Sertés: Hús és egyéb ehető szövetek: 3 nap

Ceffect® 2.5%



Ceffect 25 mg/ml szuszpenziós injekció.



➤ Javallat, adagolás és az alkalmazás módja

Az összes kezelést intramuszkuláris injekcióban kell beadni.

A termékfotó
szimbolikus.



MALAC Javallat

Meningitisz (*Streptococcus suis*), artritisz (*Streptococcus* spp.,
E. coli vagy egyéb, cefkvinomra érzékeny baktériumok),
epidermitisz (*Staphylococcus hyicus*)

Adagolás

2 mg cefkvinom/ttkg (2 ml/25 ttkg) naponta egyszer,
5 egymást követő napon át

➤ Élelmezés-egészségügyi várakozási idők

Szarvasmarha: Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap | **Tej:** 24 óra

Sertés: Hús és egyéb ehető szövetek: 3 nap

➤ Kiszerelés

100 ml-es üvegben

➤ Elérhető

Csak állatorvosi rendelvényre

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek összefoglalója



Tk.sz. Ceffect 25 mg/ml szuszpenziós injekció szarvasmarha és sertés részére A.U.V.: 3279/1/12
NÉBIH ÁTI (100 ml), 3279/2/12 NÉBIH ÁTI (250 ml). A forgalomba hozatali engedély jogosultja:
EMDOKA bvba. Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasí-
tást, vagy kérdezze a Elanco képviselőt: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszon-
harmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

Ceffect[®] LC 75 mg



Ceffect LC 75 mg intramammalis kenőcs laktáló tehenek számára A.U.V.



➤ **Hatóanyag**

Cefkvinom 75 mg/fecskendő

➤ **Célállat faj**

szarvasmarha (laktáló tehenek)



A termékfotó szimbolikus.

➤ **Javallat**

Az alábbi, cefkvinomra érzékeny mikroorganizmusok okozta klinikai tügygyulladás kezelésére laktáló tejelő teheneknél: *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Staphylococcus aureus* és *Escherichia coli*.

➤ **Adagolás és az alkalmazás módja**

Intramammalis alkalmazásra. Egy fecskendő tartalmát kell a fertőzött tügygyedbe juttatni a tügybimbón keresztül 12 óránként, 3 egymást követő fejés után.

➤ **Élvezettség-egészségügyi várakozási idő**

Hús és egyéb ehető
szövetek: 4 nap

Tej: 5 nap (120 óra)

➤ **Kiszerelés**

24 x 8 g intramammalis
fecskendő

➤ **Elérhető**

Csak állatorvosi
rendelvényre

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszöglátója



Tk.sz. Ceffect LC 75 mg intramammalis kenőcs laktáló tehenek számára A.U.V.: 3486/1/14 NÉBIH ÁTI, 3486/2/14 NÉBIH ÁTI, 3486/3/14 NÉBIH ÁTI, 3486/4/14 NÉBIH ÁTI. A forgalomba hozatali engedély jogosultja: EMDOKA bvba. Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Elanco képviselőt: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com



Coliprotec F4/F18 liofilizátum belsőleges szuszpenzióhoz.

➤ Hatóanyagok

Élő, nem patogén *Escherichia coli* O8:K87* (F4ac)

Élő, nem patogén *Escherichia coli* O141:K94* (F18ac)

* nem attenuált

➤ Célállat fajok

Sertés

➤ Javallatok

18 naposnál idősebb sertések aktív immunizálására az enterotoxikus, F4- és F18-pozitív *Escherichia coli* ellen az alábbiak érdekében:

- a fertőzött malacok *E. coli* által okozott, mérsékelttől a súlyosig terjedő választás utáni hasmenése előfordulási gyakoriságának csökkentése;
- az enterotoxikus, F4- és F18-pozitív *E. coli* bélsárral történő ürítésének csökkentése a fertőzött sertésekben.

➤ Adagolás és alkalmazási mód

- Szájon át történő alkalmazás. Vakcinázási program: egyszeri adag szájon át, 18 napos kortól drenecs formában vagy az ivóvízzel (itatóedényekből, tartályokból vagy az itatórendszeren keresztül).
- 50 adagos kiszerezés: Oldja fel a liofilizátumot, 10 ml vizet öntve az üvegbe. Jól rázza össze, és öntse át a szuszpenziót egy beosztásokkal ellátott tartályba, keverjen hozzá újra vizet, 100 ml-es ösztérfogatig feltöltve a tartályt. Rázza jól össze, és használja fel 4 órán belül.



A termékfotó szimbolikus.

Egyedi alkalmazás, drencseléssel

Drencs

A sertéseknél alkalmazzon egyszeri 2 ml-es dózist szájon át, testsúlytól függetlenül.

Ivóvízrendszeren keresztül

Itatókból, tartályokból történő alkalmazás

Hígítsa fel a feloldott vakcinát annyi vízben, amennyit a sertések egy 4 órás időszak alatt megisznak.

Vízvezetéseken keresztül, adagolópumpa (adagoló) segítségével történő alkalmazás

Hígítsa fel a feloldott vakcinát az adagolópumpa törzsoldatának szükséges mennyiségében. A törzsoldat mennyiségét annak a vízmennyiségnek a segítségével kell kiszámítani, amelyet a sertések egy 4 órás időszak alatt megisznak, megszorozva az adagolópumpa teljesítményével (tizedes értékben).

Az immunitás kezdete: a vakcinázás után 7 nappal

Immunitástartósság: a vakcinázás után 21 nap

➤ Élelmezés-egészségügyi várákozási idő

0 nap

➤ Kiszerezés

4 x 50 adagot tartalmazó
injekciós üveg

➤ Elérhető

Csak állatorvosi rendelvényre

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek összefoglalója



Tk.sz. Coliprotec F4/F18 liofilizátum belsőleges szuszpenzióhoz, sertéseknek: EU/2/16/202/001-003.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Elanco GmbH. Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Elanco képviselőjét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

Elanco

Denagard 100 mg/ml oldatos injekció. 🌟

➤ **Hatóanyag**

Tiamulin 100,0 mg (1 ml-ben)

➤ **Célállat faj**

Sertés

➤ **Javallatok, adagolás és az alkalmazás módja**



A termékfotó szimbolikus.

SERTÉS **Javallat**

Sertésdizentéria	<i>Brachyspira hyodysenteriae</i> , <i>Bacteroides</i> spp. és <i>Fusobacterium</i> spp.	1,0 ml / 12,5 ttkg, IM, naponta, 1-2 napon át
Vastagbélgyulladás (kolitisz)	<i>Brachyspira pilosicoli</i>	1,0 ml / 12,5 ttkg, IM, naponta, 1-2 napon át
Enzootiás pneumonia	<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>	1,5 ml / 12,5 ttkg, IM, naponta, 3 napon át
Artritisz	<i>Mycoplasma hyosynoviae</i>	1,5 ml / 12,5 ttkg, IM, naponta, 3 napon át
Pleuropneumonia	<i>Actinobacillus</i> spp., <i>Pasteurella multocida</i>	2 ml / 12,5 ttkg, IM, naponta, 2-3 napon át
Ileitisz	<i>Lawsonia intracellularis</i>	2 ml / 12,5 ttkg, IM, naponta, 2-3 napon át

➤ **Élelmezés-egészségügyi várokozási idő**

28 nap

➤ **Kiszerelés**

100 ml-es üveg

➤ **Elérhető**

Csak állatorvosi
rendelvényre





Denagard 200 mg/ml oldatos injekció.



➤ **Hatóanyag**

Tiamulin 162,2 mg (1 ml-ben)

➤ **Célállat faj**

Sertés

➤ **Javallatok, adagolás és az alkalmazás módja**



A termékfotó szimbolikus.

SERTÉS **Javallat**

Javallat	Adagolás
Sertésdizentéria <i>Brachyspira hyodysenteriae</i> , <i>Bacteroides</i> spp. és <i>Fusobacterium</i> spp.	8,0 mg tiamulin bázis/ttkg (1,0 ml készítmény/20 ttkg) IM, naponta, 1-2 napon át
Vastagbélgyulladás (kolitisz) <i>Brachyspira pilosicoli</i>	8,0 mg tiamulin bázis/ttkg (1,0 ml készítmény/20 ttkg) IM, naponta, 1-2 napon át
Enzootiás pneumonia <i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>	12,3 mg tiamulin bázis/ttkg (1,5 ml készítmény/20 ttkg) IM, naponta, 3 napon át
Artritisz <i>Mycoplasma hyosynoviae</i>	12,3 mg tiamulin bázis/ttkg (1,5 ml készítmény/20 ttkg) IM, naponta, 3 napon át
Pleuropneumonia <i>Actinobacillus</i> spp., <i>Pasteurella multocida</i>	12,3 mg tiamulin bázis/ttkg (1,5 ml készítmény/20 ttkg) IM, naponta, 3 napon át
Ileitisz <i>Lawsonia intracellularis</i>	12,3 mg tiamulin bázis/ttkg (1,5 ml készítmény/20 ttkg) IM, naponta, 3 napon át

➤ **Élelmezés-egészségügyi várákozási idő**

28 nap

➤ **Kiszerelés**

100 ml-es üveg

➤ **Elérhető**

Csak állatorvosi
rendelvényre

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszereglője



Tk.sz. Denagard 200 mg/ml oldatos injekció sertések részére A.U.V.: 3128/1/12 NÉBIH ÁTI (100 ml). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Elanco GmbH. Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Elanco képviselőjét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com



Denagard 100 mg/g gyógypremix.

➤ Hatóanyag

Tiamulin-hidrogén-fumarát 100 mg/g

➤ Célállat fajok

Sertés, házityúk (brojlercsirkék, tojóhibrid jércék, tojó-/húshibrid tenyészállomány), pulyka (pipék és tenyészállomány), nyúl

➤ Javallatok, adagolás és az alkalmazás módja



A termékfotó szimbolikus.

SERTÉS Javallat

Adagolás*

Élmezés-egészségügyi várákozási idő

Brachyspira hyodysenteriae által okozott sertésdizentéria gyógykezelése, *Brachyspira pilosicoli* által okozott kolitisz gyógykezelése

5–10 mg /testtömeg-kg naponta,
7–10 egymást követő napon át

Hús és egyéb ehető szövetek:
6 nap

Lawsonia intracellularis által okozott proliferatív enteropátia (ileitisz) gyógykezelése

7,5 mg /testtömeg-kg naponta,
10–14 egymást követő napon át

Hús és egyéb ehető szövetek:
6 nap

Mycoplasma hyopneumoniae által okozott enzootiás pneumonia gyógykezelése

5–10 mg /testtömeg-kg naponta,
7–10 egymást követő napon át

Hús és egyéb ehető szövetek:
6 nap

HÁZITYÚK Javallat

Adagolás*

Élmezés-egészségügyi várákozási idő

Mycoplasma gallisepticum által okozott idült légzőszervi megbetegedés (CRD) és *Mycoplasma synoviae* által okozott légzságyulladás gyógykezelése és metafilaxisa

25 mg/testtömeg-kg naponta
3–5 egymást követő napon át

Hús és egyéb ehető szövetek:
1 nap, Tojás: 0 nap

PULYKA Javallat

Adagolás*

Élmezés-egészségügyi várákozási idő

Mycoplasma gallisepticum, *Mycoplasma meleagridis* és *Mycoplasma synoviae* által okozott fertőző szinusztisz és légzságyulladás gyógykezelése és metafilaxisa

40 mg/testtömeg-kg naponta
3–5 egymást követő napon át

Hús és egyéb ehető szövetek:
4 nap

NYÚL Javallat

Adagolás*

Élmezés-egészségügyi várákozási idő

Járványos nyúl enteropátia (ERE) gyógykezelése és metafilaxisa

3 mg/testtömeg-kg naponta
2–3 egymást követő napon át
A metafilaktikus kezelést
3–4 hétig kell alkalmazni
az elválasztást követő héttől

Hús és egyéb ehető szövetek:
0 nap

*a megadott érték mg tiamulin-hidrogén-fumarát/
ttkg adagnak felel meg

➤ **Kiszerelés**
25 kg-os zsák

➤ **Elérhető**
Csak állatorvosi rendelvényre

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek összefoglalója



Tk.sz. Denagard 100 mg/g gyógypremix sertések, házityúkok, pulykák és nyulak részére A.U.V.: 2126/1/06 ÁOGYTI (1 kg-os zsák), 2126/2/06 ÁOGYTI (2,5 kg-os zsák), 2126/3/06 ÁOGYTI (5 kg-os zsák), 2126/4/06 ÁOGYTI (10 kg-os zsák), 2126/5/06 ÁOGYTI (25 kg-os zsák). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Elanco GmbH. Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze az Elanco képviselőjét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com



Denagard 450 mg/g granulátum ivóvízbe keveréshez. ✨

➤ Hatóanyag

Tiamulin-hidrogén-fumarát 450 mg/g
(365 mg/g tiamulinnal egyenértékű)

➤ Célállat fajok

Sertés, házityúk, pulyka

➤ Javallat, adagolás és alkalmazási mód

A termékfotó
szimbolikus.



SERTÉS

Javallat

*Brachyspira hyodysenteriae** által okozott
sertésdizentéria gyógykezelése*

*Brachyspira pilosicoli** által okozott
vastagbélgyulladás (kolitisz) gyógykezelése

A sertések *Lawsonia intracellularis** által
okozott proliferatív enteropátiájának (ileitisz)
gyógykezelése

*Mycoplasma hyopneumoniae** által okozott
enzootiás pneumonia gyógykezelése és
metafilaxisa, beleértve a *Pasteurella*
multocida által súlyosbított fertőzéseket

*Actinobacillus pleuropneumoniae** által okozott
pleuropneumonia gyógykezelése

Adagolás és alkalmazási mód**

8,8 mg/ttkg tiamulin-hidrogén-fumarát (megfelel
19,6 mg/ttkg készítménynek) naponta a sertések
ivóvizébe keverve 3-5 egymást követő napon át

8,8 mg/ttkg tiamulin-hidrogén-fumarát (megfelel
19,6 mg/ttkg készítménynek) naponta a sertések
ivóvizébe keverve 3-5 egymást követő napon át

8,8 mg/ttkg tiamulin-hidrogén-fumarát (megfelel
19,6 mg/ttkg készítménynek) naponta a sertések
ivóvizébe keverve 5 egymást követő napon át

20 mg/ttkg tiamulin-hidrogén-fumarát (megfelel
44,4 mg/ttkg készítménynek) naponta,
5 egymást követő napon át.

20 mg/ttkg tiamulin-hidrogén-fumarát (megfelel
44,4 mg/ttkg készítménynek) naponta,
5 egymást követő napon át.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idők

Hús és egyéb ehető szövetek:
2 nap

Hús és egyéb ehető szövetek:
2 nap

Hús és egyéb ehető szövetek:
2 nap

Hús és egyéb ehető szövetek:
4 nap

Hús és egyéb ehető szövetek:
4 nap

HÁZITYÚK

Javallat

*Mycoplasma gallisepticum** okozta krónikus
légzőszervi betegség (CRD) gyógykezelése
és metafilaxisa

*Mycoplasma synoviae** okozta légúti gyulladás
és fertőző szinovitisz gyógykezelése és metafilaxisa

Adagolás és alkalmazási mód**

25 mg/ttkg tiamulin-hidrogén-fumarát (megfelel
55,6 mg/ttkg készítménynek) naponta,
3-5 egymást követő napon át

25 mg/ttkg tiamulin-hidrogén-fumarát (megfelel
55,6 mg/ttkg készítménynek) naponta,
3-5 egymást követő napon át

Élelmezés-egészségügyi várakozási idők

Hús és egyéb ehető szövetek:
2 nap

Tojás: Nulla nap

Hús és egyéb ehető szövetek:
2 nap

Tojás: Nulla nap

PULYKA

Javallat

Mycoplasma gallisepticum, *Mycoplasma synoviae* és
*Mycoplasma meleagridis** okozta fertőző szinusztisz
és légzsákgyulladás gyógykezelése és metafilaxisa

Adagolás és alkalmazási mód**

40 mg/ttkg tiamulin-hidrogén-fumarát (megfelel
88,9 mg/ttkg készítménynek) naponta,
3-5 egymást követő napon át

Élelmezés-egészségügyi várakozási idők

Hús és egyéb ehető szövetek:
6 nap

*tiamulinra érzékeny **a mg-ban megadott érték a tiamulin-hidrogén-fumarátra vonatkozik/ttkg. A megfelelénél megadott érték a készítményre vonatkozik/ttkg.

➤ Kiszerelés

1112 g

➤ Elérhető

Kizárólag állatorvosi vényre adható ki

Tk.sz. Denagard 450 mg/g granulátum ivóvízbe keveréshez sertések, házityúk és pulykák részére: 2073/3/06
ÁOGYTI (1112 g), 2073/4/06 ÁOGYTI (5 kg). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Elanco GmbH. Alkalmazás
előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze az Elanco képviselőjét:
Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399,
e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com



Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek összefoglalója



A Denagard, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak.

©2021 Elanco Animal Health. PM-HU-21-0243

Elanco



Flubenol 50 mg/g gyógypremix A.U.V.

➤ **Hatóanyag**

Flubendazol 50 mg/g

➤ **Célállat fajok**

Sertés, házityúk, pulyka, fácán


➤ **Javallatok, adagolás és alkalmazás módja**

Az alábbi fonálféreg-fajok okozta parazitózisok kezelésére a célállat fajokban:

- **Sertések:** *Metastrongylus apri*, *Ascaris suum*, *Hyostrongylus rubidus*, *Oesophagostomum dentatum*, *Trichuris suis*, *Strongyloides ransomi*.
- **Házityúk, pulyka, fácán:** *Syngamus tracheae*, *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinarum*, *Capillaria* spp., *Trichostrongylus tenuis*.

➤ **Adagolás és ételmezés-egészségügyi várakozási idők**

Szájon át, takarmányba keverve alkalmazandó.



A termékfotó szimbolikus.

Állatfajok	Adagolás	Ételmezés-egészségügyi várakozási idő
SERTÉS - tenyészállatok	1,0 mg flubendazol/ttkg 10 napon át	Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap
MALACOK, HÍZÓK	1,0 mg flubendazol/ttkg 5 napon át, súlyos <i>Trichuris</i> fertőzöttség esetén 10 napon át	Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap
HÁZITYÚK	1,43 mg flubendazol/ttkg 7 napon át	Hús és egyéb ehető szövetek: 3 nap Tojás: nulla nap
PULYKA	1,43 mg flubendazol/ttkg 7 napon át	Hús és egyéb ehető szövetek: 1 nap
FÁCÁN	2,86 mg flubendazol/ttkg 7 napon át	Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap

- A készítmény nem keverhető ivóvízbe vagy folyékony takarmányba. Pelletre vagy szemes takarmányra szórni tilos!

➤ **Kiszerezés**

25 kg-os zsák

➤ **Elérhető**

Csak állatorvosi rendelvényre





Glutellac® takarmány-kiegészítő borjak számára. ✨

➤ **Összetétel**

Nátrium-acetát 36,6%, dextróz 39,0%,
kálium-klorid 6,4%, nátrium-klorid 6,4%,
nátrium-diacetát 3,2%

➤ **Célállat faj**

Borjú

➤ **Javallatok**

Rehidratálásra és az elektrolit-háztartás stabilizálására a hasmenés veszélyének kitett borjakban.

➤ **Alkalmazási útmutató**

Emésztőszervi problémák (hasmenés) veszélye esetén, közben és után: a borjaknak vízbe, tejbe vagy tejpótlóba keverve adjon 1 üveg (50 ml) Glutellac®-ot naponta kétszer, 1-7 napon át. Kérje állatorvosa tanácsát a készítmény alkalmazásával és a kezelés időtartamával kapcsolatban.

➤ **Élmezés-egészségügyi várakozási idő**

Nincs

➤ **Kiszerezés**

3 x 8 x 50 ml

➤ **Elérhető**

Nem vényköteles termék



A termékfotó szimbolikus.

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek összefoglalója





100 mg/ml oldatos injekció. ⚡

➤ **Hatóanyag**

Tulatromicin 100 mg

➤ **Célállat fajok**

Szarvasmarha, sertés, juh

➤ **Javallatok, adagolás és alkalmazási mód, ételmezés-egészségügyi várakozási idők**

A készítmény csak akkor használható, ha a betegséget az állományban már megállapították.

A termékfotó
szimbolikus.



SZARVASMARHA

Javallat

A szarvasmarhák tulatromicin iránt érzékeny *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni* és *Mycoplasma bovis* fajok okozta légzőszervi megbetegedése (BRD) kezelésére és metaflaxisára. A szarvasmarhák tulatromicin iránt érzékeny *Moraxella bovis* okozta fertőző keratokonjunktivitisze (IBK) kezelésére.

Adagolás és alkalmazási mód

Egyetlen szubkután injekció 2,5 mg tulatromicin/ttkg adagban (megfelel 1 ml/40 ttkg mennyiségnek)

Ételmezés-egészségügyi várakozási idő

Hús és egyéb ehető szövetek: 22 nap
A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatoknál nem engedélyezett.

SERTÉS

Javallat

A sertések tulatromicin iránt érzékeny *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Haemophilus parasuis* és *Bordetella bronchiseptica* fajok okozta légzőszervi megbetegedése (SRD) kezelésére és metaflaxisára.

Adagolás és alkalmazási mód

Egyetlen intramuszkuláris injekció a nyak oldalába 2,5 mg tulatromicin/ttkg adagban (megfelel 1 ml/40 ttkg mennyiségnek)

Ételmezés-egészségügyi várakozási idő

Hús és egyéb ehető szövetek: 13 nap

JUH

Javallat

Szisztémás kezelést igénylő *Dichelobacter nodosus* okozta fertőző pododermatitisz (panarícium) korai stádiumokban történő kezelésére.

Adagolás és alkalmazási mód

Egyetlen intramuszkuláris injekció a nyak izomzatába 2,5 mg tulatromicin/ttkg adagban (megfelel 1 ml/40 ttkg mennyiségnek)

Ételmezés-egészségügyi várakozási idő

Hús és egyéb ehető szövetek: 16 nap
A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatoknál nem engedélyezett.

➤ **Kiszerelés** 100 ml-es üveg

➤ **Elérhető** Csak állatorvosi rendelvényre

Link és QR-kód: a készítmény jellemzőinek összefoglalója



Tk.sz. Increxxa 100 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és juhek számára: EU/2/20/258/001 (20 ml), EU/2/20/258/002 (50 ml), EU/2/20/258/003 (100 ml), EU/2/20/258/004 (250 ml), EU/2/20/258/005 (500 ml).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Elanco GmbH. Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Elanco képviselőjét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com



Kexxtone 32,4 g folyamatos hatóanyag-leadású intraruminális készítmény.



➤ **Hatóanyag**

Monenzin 32,4 g

➤ **Célállat faj**

Szarvasmarha (tejlő tehén és üsző)

➤ **Javallat**

A tejlő teheneknél/üszőknél fellépő ketózis előfordulásának csökkentésére olyan állatok esetében, amelyeknél az ellés (után) körüli időben várhatóan fellépne a ketózis.

➤ **Adagolás és alkalmazási mód**

- Intraruminális alkalmazás. A megfelelő beadóeszközt használva, 3–4 héttel a tejlő tehén/üsző ellésének várható időpontja előtt egy intraruminális készítményt kell alkalmazni.
- A Kexxtone átlagosan naponta 335 mg-os monenzin-adagot biztosít, körülbelül 95 napon keresztül.

➤ **Élelmezés-egészségügyi várákozási idő**

Hús és egyéb ehető szövetek:
nulla nap

Tej: nulla nap

➤ **Kiszerelés**

1 x 5 db intraruminális
készítmény

➤ **Elérhető**

Csak állatorvosi
rendelvényre



Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek összefoglalója



Tk.sz. Kexxtone 32,4 g folyamatos hatóanyag-leadású intraruminális készítmény szarvasmarhák számára: EU/2/12/145/001-003. A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Elanco GmbH. Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Elanco képviselőjét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com



Pulmotil G 200 g/kg gyógypremix.



➤ Hatóanyag

Tilmikozin (tilmikoizin-foszfát formájában) 200 g/kg

➤ Célállat fajok

Sertés, nyúl

➤ Javallatok

Sertések: *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Mycoplasma hyopneumoniae* és *Pasteurella multocida* tilmikozinra érzékeny törzsei által okozott légzőszervi megbetegedések gyógykezelésére.

Nyulak: *Pasteurella multocida* és *Bordetella bronchiseptica* tilmikozinra érzékeny törzsei által okozott légzőszervi megbetegedések gyógykezelésére.

➤ Adagolás és alkalmazási mód

• Takarmányba keverve alkalmazandó.

A készítmény nem keverhető ivóvízbe vagy folyékony takarmányba.

• Az adag kiszámításához az alábbi képletet kell használni:

$$\frac{[\text{kg/mg készítmény/ttkg} \times \text{kezelendő állatok átlagos testtömege (kg)}]}{\text{átlagos napi takarmányfelvétel / állat (kg)}} = \dots \text{ mg készítmény / kg takarmány}$$



A termékfotó szimbolikus.

Célállat fajok	Javallatok	Adagolás	Kezelés időtartama
Sertés	Légzőszervi fertőzések kezelése	16 mg tilmikozin/testtömeg-kg /nap	15-21 nap
Nyúl	Légzőszervi fertőzések kezelése	12,5 mg tilmikozin/testtömeg-kg /nap	7 nap

➤ Élelmezés-egészségügyi várakozási idő

Hús és egyéb ehető szövetek:
Sertés: 21 nap
Nyúl: 4 nap

➤ Kiszerezés

10 kg-os zsák

➤ Elérhető

Csak állatorvosi rendelvényre



Tk.sz. Pulmotil G 200 g/kg gyógypremix sertéseknek és házinyulaknak A.U.V.: 2731/1/10 MgSzH ÁTI (1 kg), 2731/2/10 MgSzH ÁTI (10 kg). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Elanco GmbH. Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Elanco képviselőt: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

RespiSure 1 One vakcina A.U.V.



➤ **Hatóanyag:**

Adagonként (2 ml):

Inaktivált *Mycoplasma hyopneumoniae*, NL1042 törzs,
4,5–5,2 log₁₀ egység*

* a referenciavakcinához viszonyított ELISA relatív potenciál egység

➤ **Célállat faj**

Hízósertés

➤ **Javallatok**

- **A vakcina háromnapos malacok aktív immunizálására** szolgál a *Mycoplasma hyopneumoniae*-fertőzés által előidézett tüdőelváltozások mérséklésére hízóállományokban. Az immunitás kezdete: a vakcinázást követő 18. nap.
Az immunitástartósság: a vakcinázást követő 26 hét.
- **A vakcina háromhetes malacok aktív immunizálására** szolgál a *Mycoplasma hyopneumoniae*-fertőzés által előidézett köhögés és a testtömeg-gyarapodás csökkenésének mérséklésére hízóállományokban.
Az immunitás kezdete: a vakcinázást követő 3. hét.
Az immunitástartósság: a vakcinázást követő 23 hét.

➤ **Adagolás és alkalmazási mód**

- A vakcinát fel kell rázni és 2 ml-t aseptikusan, mélyen az izomba, lehetőség szerint a nyak oldalába kell beadni.
- Vakcinázási program: Egyetlen adag - 2 ml - vakcinát kell beadni, malacoknak háromnapos kortól adható.

➤ **Élelmezés-egészségügyi várokozási idő**

Nulla nap

➤ **Kiszerelés**

4 x 125 adag
(4 x 250 ml)

➤ **Elérhető**

Csak állatorvosi
rendelvényre



A termékfotó szimbolikus.





Sebacil 75 mg/ml ráöntő oldat A.U.V.



➤ **Hatóanyag**

Foxim 75 mg/ml

➤ **Célállat faj**

Sertés

➤ **Javallatok**

Sertések rühössége (*Sarcoptes scabiei*, var. *suis*) és tetvessége (*Haematopinus suis*) ellen.

➤ **Adagolás és alkalmazási mód**

- 1,5 g foxim / 50 ttkg, amely a készítményből 20 ml/50 ttkg mennyiségnek felel meg.
- Az oldat adagolása speciális adagoló vagy automata fecskendő segítségével történik.
- A készítményt a dorzális középvonal mentén öntsük az állat hátára. Kezdjük a fülek között és fejezzük be a faroktőnél.
- Rühösség esetén egy kezelés elegendő. Ha a fülkagylóban a rühösség különösen súlyos, érdemes 1-2 ml Sebacil ráöntő oldatot mindkét fülkagyló belső felületére is cseppenteni.
- Rühösség megelőzése céljából a tenyészkanokat félévente, a tenyészkocákat 1-2 héttel az ellés előtt, a hízókat a hizlaldába történő szállítás esetén érdemes kezelni.
- A Sebacil ráöntő oldat kék színezéket tartalmaz (a kék szín a kezelést követően néhány nap alatt eltűnik). Tetvesség esetén általában egy kezelés is elegendő.

➤ **Élelmezés-egészségügyi várakozási idő**

Hús és egyéb ehető szövetek: 17 nap

➤ **Kiszerezés**

1 liter

➤ **Elérhető**

Kizárólag állatorvosi vényre adható ki



A termékfotó szimbolikus.

Link és QR-kód: a készítmény jellemzőinek összefoglalója



Tk.sz. Sebacil 75 mg/ml ráöntő oldat sertések részére A.U.V.: 2932/1/11 MgSzH ÁTI (1 liter), 2932/2/11 MgSzH ÁTI (5 liter). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer Animal Health GmbH (Elanco company). Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Elanco képviselőjét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com



Stresnil 40 mg/ml oldatos injekció. 🌟

➤ Hatóanyag

Azaperon 40 mg

➤ Célállat faj

Sertés

➤ Javallatok, adagolás és az alkalmazás módja

Intramuszkulárisan alkalmazandó. Az injekciót minden esetben intramuszkulárisan adjuk a fül mögé, hosszú hipodermális tűvel, a fülhöz a lehető legközelebb, merőlegesen a bőrre. Egy injektálási helyre legfeljebb 5 ml injekció adható.



A termékfotó szimbolikus.

Javallatok

Adagolás

Agresszivitás
Szülészet

2 mg/ttkg (1 ml/20 ttkg)

Stresszreakciók megakadályozása
az alábbi helyzetekben:

Szívtúlterhelés

0,4 mg/ttkg (1 ml/100 ttkg)

Malacok szállítása

0,4-2 mg/ttkg (1 ml/100 ttkg-1 ml/20 ttkg)

Kanok szállítása

1 mg/ttkg (0,5 ml/20 ttkg)

Általános anesztézia előtti
premedikáció

1-2 mg/ttkg (0,5-1 ml/20 ttkg)

➤ Élelmezés-egészségügyi várakozási idő

Hús és egyéb ehető szövetek:
18 nap

➤ Kiszerezés

100 ml-es üveg


➤ Elérhető

Csak állatorvosi
rendelvényre



Tardocyclin[®]

spray A.U.V.



Tardocyclin spray A.U.V.



➤ **Hatóanyag**

Oxitetraciklin-hidroklorid 3,5 g

➤ **Célállat faj**

Szarvasmarha, sertés, juh, kecske

➤ **Javallatok**

Szarvasmarha, juh, sertés és kecske az alábbiakban felsorolt - oxitetraciklinre érzékeny - kórokozók által okozott fertőzéseinek gyógykezelésére:

- *Dichelobacter nodosus*, *Fusobacterium necrophorum* okozta lábvégfertőzések kezelésére;
- Traumás vagy műtéti eredetű felületi sebek támogató kezelésére.

➤ **Adagolás és az alkalmazás módja**

- Külsőleges alkalmazásra.
- Az érintett területet meg kell tisztítani és szárítani.
- A flakon szórófejét a kezelendő területre irányítva 20 cm távolságból kell ráfújni a készítményt.
- Alkalmazza naponta egy vagy két alkalommal.

➤ **Élelmezés-egészségügyi várakozási idő**

- Szarvasmarha, sertés, juh, kecske hús és egyéb ehető szövetek: Nulla nap
- Szarvasmarha, juh, kecske tej: Nulla nap

➤ **Kiszerelés**

250 ml-es aeroszol
palack

➤ **Elérhető**

Kizárólag állatorvosi vényre adható ki




A termékfotó szimbolikus.

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek összefoglalója



Tk.sz. Tardocyclin spray A.U.V.: 3460/1/13 NÉBIH ÁTI. A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer Animal Health GmbH (Elanco company). Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Elanco képviselőjét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com



Tylan G 100 g/kg gyógypremix.



➤ **Hatóanyag, 1 kg premix tartalmaz:**

Tilozin (tilozin-foszfát formájában) 100 g

➤ **Célállat faj(ok)**

Sertés, házityúk (brojlercsirke)

➤ **Javallatok**

Sertés *Mycoplasma hyopneumoniae* okozta enzootiás pneumóniájának, valamint *Lawsonia intracellularis* okozta proliferatív enteropátiájának gyógykezelésére.

Házityúk (brojlercsirke) *Clostridium perfringens* tilozinra érzékeny törzsei okozta elhalásos bélgyulladásának gyógykezelésére.



A termékfotó szimbolikus.

➤ **Adagolás és alkalmazási mód**

- Takarmányba keverve alkalmazandó.
- **Sertés:** 6 mg tilozin/ttkg/nap, 21 napon át.
- **Brojlercsirke:** 20 mg tilozin/ttkg/nap, 7 napon át.
- **Keverési utasítások:**

A kész takarmányba keverés előtt javasolt a szükséges gyógyszer mennyiséget 20–50 kg takarmányba keverve előkeveréket készíteni, majd ezt keverni a végső mennyiségbe.

A készítmény nem keverhető ivóvízbe vagy folyékony takarmányba.

➤ **Élelmezés-egészségügyi várákozási idő**

Nulla nap

➤ **Kiszerelés**

25 kg-os zsák

➤ **Elérhető**

Csak állatorvosi
rendelvényre

Link és QR-kód: a készítmény
jellemzőinek öszefoglalója



Tk.sz. Tylan G 100 g/kg gyógypremix sertések és házityúkok részére A.U.V.: 3633/1/15 NÉBIH ÁTI (25 kg). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Elanco GmbH. Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Elanco képviselőjét: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com