

마이코틸 300 (Micotil 300inj)

처방대상 동물용의약품



마이코틸 300은 호흡기 질병 치료를 위한 축우 전용 항생제입니다.

- 1) 파스튜렐라 헤몰리티카(*Pasteurella haemolytica*) 등의 원인균에 의한 소 호흡기 질병을 치료합니다.
- 2) 1회 주사로 14일간 효과가 지속됩니다.
- 3) 마이코틸은 1시간 이내에 폐조직으로 이동합니다.
- 4) 1회 주사임에도 주사용량이 적어(체중 100kg당 3.3mL) 주사 부위의 자극을 적게 하며, 주사하기가 편리합니다.

효능 및 효과

가. 소에서 틸미코신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료

나. 소 : 파스튜렐라 페렘(*Pasteurella multocida*), 만헤이미아 페렘(*Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella haemolytica*)

성분 및 함량

본제 1L 중
 틸미코신인산염(Tilmicosin phosphate) 300mg
 프로필렌 글리콜(Propylene glycol) 250mg

포장단위

50mL

용법 및 용량

소 : 일일 체중 kg당 본제 0.033mL(틸미코신으로서 10mg/kg, 체중 30kg당 본제 1mL)의 비율로 1회 피하주사

주의사항

- * 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- * 생후 20개월 이상의 젖소 암컷에게 사용하지 마십시오.
- * 오/남용에 의한 약화사고 및 경제적 손실을 초래할 수 있으므로 정해진 용법/용량을 준수하고, 동시에 동일 성분의 약품을 중복 투여하지 마십시오.
- * 본제 및 Macrolide계 항생제에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 동물에게 사용하지 마십시오.
- * Lincosamide계 및 다른 Macrolide계 항생제와 병용하지 마십시오.
- * 착유중인 젖소에는 사용하지 마십시오.
- * 피부나 눈에 접촉시에는 물로 깨끗이 씻어낸 후 이상 증상이 있을 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- * [휴약기간] 소 28일

저장방법/유효기간

- * 실온(1~30°C)의 어두운 곳에 보관하십시오.
- * 유효기간 : 제조일로부터 36개월

