

부 표

업 체 명 : 한국엘랑코동물약품(주)	최초허가일자 : 1987. 03. 25.
제 품 명 : 바이콕신 수용액 (수출명 : Baycoxin oral solution)	변경허가일자 : 1995. 01. 17. : 2002. 11. 08.
허가번호 : 제 8 - 215 호(제조)	: 2005. 04. 16. : 2005. 10. 04. : 2007. 05. 21. : 2008. 04. 15. : 2011. 11. 14. : 2014. 12. 23. : 2017. 04. 24. : 2020. 08. 03. : 2021. 12. 16.

1. 원료약품 및 분량 (본제 1L중)

◦ 톨트라주릴(Toltrazuril, 별규)	-----	25g
◦ 트롤아민(Trolamine, 미국약전)	-----	300g
◦ 폴리에틸렌글리콜(Polyethylene glycol, 미국약전)	-----	적당량

2. 성상

무색 내지 갈색의 투명한 용액

3. 제조방법

상기 원료를 가지고 동물용의약품공정서 액제 제법에 준하여 제조한다.

4. 효능 및 효과

닭의 콕시듐증 예방 및 치료

5. 용법 및 용량

음수 1L당 본제 1ml 비율로 섞어 2일간 투약 후 5일 경과하여 1회 반복 투여한다.

6. 포장단위

100ml, 200ml, 500ml, 1L, 5L.

7. 저장방법 및 사용기간

가. 저장방법 : 실온(1~30℃)의 어두운 곳에 보관.

나. 용기종류 : 기밀용기

다. 사용기간 : 제조일로부터 24개월

8. 주의사항

가. 휴약기간 : 14일

휴약기간을 준수하지 않을 경우 축산물 내에 잔류할 수 있으므로 시간까지 정확하게 계산하여 투약하십시오.

나. 사용방법상의 주의사항

- (1) 오·남용에 의한 약화사고 및 경제적 손실을 초래할 수 있으므로 정해진 용법·용량을 준수하십시오.
- (2) 과다하게 투여 시 또는 자동투약기를 이용하여 투여 시에 과포화 현상으로 침전이 발생할 수 있습니다. (1% 이상 시)
- (3) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- (4) 본 약제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 동물에게는 사용하지 마십시오.
- (5) 물에 희석한 약액은 전부 사용하고 남았을 경우 재사용하지 마십시오.
- (6) 안전성, 유효성에 문제를 일으킬 수 있으므로 다른 약제와 함께 희석하여 사용하지 마십시오.

다. 기타 주의사항

- (1) 수의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- (2) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.
- (3) 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 사용하지 마십시오.
- (4) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 정하여진 저장방법에 따라 보관하십시오.
- (5) 사용기한이 경과한 제품이나 다 쓴 용기 및 포장지는 사용하지 마시고 안전하게 폐기하십시오.
- (6) 오·남용 및 내성출현 예방을 위하여 동물약품의 사용내역을 빠짐없이 기록하여 주십시오.
- (7) 피부나 눈에 접촉 시에는 물로 깨끗이 씻어낸 후 이상증상이 있을 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- (8) 오용 및 품질저하 방지를 위하여 공급된 용기나 포장지 이외의 다른 용기에 소분하여 보관하지 마십시오.
- (9) 만일 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·부패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- (10) 기타 제품에 대하여 문의사항이 있으신 경우 제조사로 연락하여 주시기 바랍니다.

9. 기준 및 시험방법

가. 제품의 기준 및 시험방법 : 별첨 1

나. 원료약품의 기준 및 시험방법 : 별첨 2

10. 비교 : 동물용의약품

가. 수출용에 한하여 제품명을 “Baycox 2.5% oral solution”을 추가 사용

