



Vademécum 2022

BelamylTM-R

Composición garantizada

Cada 1 mL de solución inyectable después de reconstituir el frasco Vial A con el frasco Vial B contiene:

- Vitamina B1 (tiamina clorhidrato)10 mg
- Vitamina B2 (riboflavina).....3 mg
- Nicotinamida.....100 mg
- Vitamina B12 (cianocobalamina).....50 µg
- Excipientes c.s.p.1 mL.

Especie de destino

Bovinos, equinos, ovinos, porcinos y caninos para el tratamiento de las anemias normocíticas y macrocíticas o megaloblásticas y normocrómicas.

Indicaciones de uso

En bovinos, equinos, ovinos, porcinos y caninos para el tratamiento de las anemias normocíticas y macrocíticas o megaloblásticas y normocrómicas.

BELAMYLTTM-R favorece la rápida restitución de los glóbulos rojos destruidos en la anaplasmosis, babesiosis, tripanosomosis y en otras enfermedades parasitarias.

BELAMYLTTM-R favorece la convalecencia y la rápida recuperación de animales agotados, enflaquecidos, al igual que en el post-operatorio de intervenciones quirúrgicas.

Modo de uso

Debe administrarse únicamente por vía intramuscular:

- Bovinos y equinos.....1mL/50 kg
- Porcinos y ovinos.....1mL/25 kg
- Caninos.....1mL/10 kg

Estas dosis se pueden aplicar diariamente o en días alternos repitiéndolas hasta completar 5 a 10 inyecciones en total.

En los casos de anemias avanzadas o cuando se necesita una acción rápida en el tratamiento, está indicado doblar la dosis.

El éxito en el uso de este medicamento depende de la exactitud del diagnóstico.



Advertencias/precauciones/recomendaciones

- Uso veterinario.
- Consulte al médico veterinario.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No administrar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a los ingredientes activos.

Tiempo de retiro

No se requiere periodo de retiro antes del sacrificio.

Condiciones de almacenamiento

No almacenar a temperaturas superiores a 30°C. Evítese la congelación.

Presentación

Frascos de vidrio ámbar Tipo I por 10, 30, 50, 100, 250 y 500 mL.

- 10 mL (Vial A con 8 ml y Vial B con 2 ml).
- 50 mL (Vial A con 40 ml y Vial B con 10 ml).
- 100 mL (Vial A con 98 ml y Vial B con 2 ml).
- 250 mL (Vial A con 245 ml y Vial B con 5 ml).
- 500 mL (Vial A con 490 ml y Vial B con 10 ml).

Registros

Colombia Reg. ICA No. 343-DB

Venta bajo prescripción del médico veterinario.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
USO VETERINARIO.