

※ 양계투약조건표

구분	1,000수당 투여량	
	산란계	초생추
중·대추		150 ml
성 계		250 ml
육계	초생추·전기	100 ml
	후 기	150 ml

나. 넙치

어체 톤당 본제 100ml(어체 kg당 0.1ml로 부타포스판 10mg에 해당)을 5일간 경구 투여

6. 포장단위

500ml, 1000ml, 2000ml

7. 저장방법 및 사용기간

가. 저장방법 : 실온(1-30℃)의 어두운 곳에 보관.

나. 용기종류 : 기밀용기

다. 사용기간 : 제조일로부터 18개월

8. 사용상의 주의사항

가. 경고

본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.

나. 금기사항

오·남용에 의한 약화사고 및 경제적 손실을 초래할 수 있으므로 정해진 용법·용량을 준수하고, 동시에 동일성분의 약품을 중복 투여하지 마십시오.

다. 투여 시 부작용 우려사항

피부나 눈에 접촉 시에는 물로 깨끗이 씻어낸 후 이상 증상이 있을 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

라. 일반적 주의사항

(1) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.

(2) 수의사, 약사 또는 수산질병관리사(수산 전문가)의 지시에 따라 사용하십시오.

마. 적용상의 주의

오·남용을 방지하기 위하여 동물약품의 사용내역을 빠짐없이 기록하여 주십시오.

바. 저장상의 주의사항

(1) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.

(2) 안전성 및 유효성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.

(3) 오용 및 품질저하 방지를 위하여 공급된 용기나 포장지 이외의 다른 용기에 소분하여

보관하지 마십시오.

사. 기타

- (1) 지정된 어종, 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 사용하지 마십시오.
- (2) 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기 처리하십시오.
- (3) 다 쓴 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- (4) 기타 제품에 대하여 문의사항이 있으신 경우 제조사로 연락하여 주시기 바랍니다.
- (5) 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

9. 기준 및 시험방법

가. 제품의 기준 및 시험방법 : 별첨1

나. 원료약품의 기준 및 시험방법 : 별첨2

10. 비고 : 동물용의약품

