

Neporex 2 SG
Regulator wzrostu owadów przeznaczony do zwalczania larw much

Substancja czynna: 20 mg/1g cyromazyny (N-cyklopropylo-1,3,5-triazyno-2,4,6-triamina)

Sposób działania:

Neporex 2 SG działa jako regulator wzrostu owadów i wpływa na proces przepoczwarczenia się larw much. Nie zabija dorosłych owadów. Eliminacja dorosłej populacji much następuje stopniowo i staje się widoczna od jednego do dwóch tygodni po zastosowaniu preparatu. Dla uzyskania szybszej redukcji dorosłej populacji much zaleca się użycie preparatu na dorosłe owady.

Sposób użycia

Neporex 2 SG jest granulatem rozpuszczalnym w wodzie, przeznaczonym do posypywania, opryskiwania oraz polewania. Zalecana wielkość dawki wynosi 0,5 g substancji czynnej na m², niezależnie od sposobu zastosowania. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej ulotce informacyjnej.

Środki ostrożności i pierwsza pomoc:

Bezpieczeństwo osoby stosującej

Zastosować wszelkie środki zmniejszające narażenie wykonującego zabieg na działanie preparatu. Nie spożywać i nie wdychać. Unikać zanieczyszczenia skóry, oczu oraz ubrania. W czasie posypywania używać rękawic ochronnych. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania preparatu. Po pracy należy umyć części ciała narażone na kontakt z preparatem i zmienić ubranie. W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast przerwać pracę, zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę lub opakowanie produktu

Pierwsza pomoc:

W razie złego samopoczucia należy zwrócić się o pomoc lekarską (pokazać lekarzowi etykietę jeżeli to możliwe).

Narażenie inhalacyjne: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze.

W przypadku kontaktu ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone odzież i obuwie, umyć natychmiast zabrudzoną skórę wodą z mydłem, spłukać dokładnie wodą.

W przypadku kontaktu z oczami: Płukać oczy wodą przez kilkanaście minut i natychmiast wezwać lekarza.

W przypadku połknięcia: Przeplukać usta wodą. Pić wodę profilaktycznie.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy i skutki uboczne:

Nie odnotowano zatrucia u człowieka.

Antidotum:

Brak specyficznego antidotum, zastosować terapię objawową.

Ogólne zalecenia:

Unikać zanieczyszczenia preparatem poidel i źłobów.

Nie splukiwać do wód powierzchniowych lub kanalizacji.

Ilość produktu w opakowaniu:

Sposób usuwania produktu i materiałów odpadowych

Odpady produktu oraz zużyte opakowania należy zniszczyć w urządzeniach przeznaczonych do utylizacji chemikaliów.

Warunki przechowywania:

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 2°C do 30°C. Chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem. Przechowywać z dala od żywności, pasz i odżywek

Podmiot odpowiedzialny:

Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Niemcy, +48 22 440 33 00

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym:

2859/05

Przed użyciem należy zapoznać się z załączoną ulotką informacyjną.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi.

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanej spalarni.

Nr partii:

Data produkcji:

Data ważności:

Ulotka informacyjna

Neporex 2 SG

Neporex 2 SG jest granulatem rozpuszczalnym w wodzie przeznaczonym do posypywania, opryskiwania i polewania. Zalecana wielkość dawki wynosi 0,5 g substancji czynnej na m², niezależnie od sposobu zastosowania.

Posypywanie:

Zastosować Neporex 2 SG bezpośrednio i równomiernie na miejsca rozmnażania się much. Stosować posypywanie tylko w przypadku mokrego lub płynnego obornika.

Opryskiwanie:

Rozpuścić i dokładnie wymieszać wskazaną ilość preparatu Neporex 2 SG w odpowiadającej objętości wody. Rozpylać na miejsca rozmnażania się much za pomocą rozpylacza plecakowego lub automatycznym urządzeniem rozpylającym.

Polewanie:

Rozpuścić i dokładnie wymieszać wskazaną ilość preparatu Neporex 2 SG w odpowiadającej objętości wody. Stosować równomiernie na miejsca rozmnażania się much za pomocą kanistra do polewania.

Ogólne zalecenia:

Należy zidentyfikować miejsca rozmnażania się much przed zastosowaniem i potraktować wszystkie miejsca rozmnażania się równocześnie. Neporex 2 SG należy stosować tylko na miejsca rozmnażania się much. Nie zaleca się stosowania preparatu na miejsca odpoczywania much (ściany, sufit), ponieważ nie działa na dorosłe postacie much.

Przerwy w stosowaniu:

Zalecane przerwy w stosowaniu preparatu zależą od zarządzania i od metod przetrzymywania zwierząt jak i od warunków klimatycznych. Może zmieniać się od 2 – 3 tygodni do paru miesięcy. Więcej określonych zaleceń podano poniżej.

Obory				
	<p>Głęboka ściółka. Pasy szerokości ok. 50 cm należy potraktować produktem równomiernie wzdłuż ścian oraz wokół i pod instalacjami gdzie ściółka nie jest zgniatana. Potraktować miejsca wokół karmników i poidel oraz w miejscach zbierania się odpadków.</p> <p>W klatkach dla cieląt trzymanyh na zewnątrz należy potraktować całą powierzchnię. Zabieg powtórzyć po każdym czyszczeniu lub gdy larwy much zostaną znalezione. Preparat Neporex 2 SG należy stosować przez spryskiwanie lub polewanie około 3 dni po czyszczeniu i powtórzyć zabieg po każdym usunięciu ściółki lub kiedy larwy zostaną znajdowane.</p>	Ilość preparatu Neporex 2 SG do zastosowania na pasy długości 50 cm x 20 m (10 m²):		
		Do polewania	Do opryskiwania	
		250 g / 7,5 litra wody	250 g / 2,5 litra wody	
Bydło na podłodze rusztowej				
	<p>Należy potraktować równomiernie całą podłogę natychmiast po oczyszczeniu kanału z nawozu. Zabieg powtórzyć po każdym czyszczeniu lub gdy larwy much zostaną znalezione.</p>	Ilość preparatu Neporex 2 SG do zastosowania na powierzchnię 10 m²		
		Na sucho		
		250 g		
Chlewnie				
	<p>Podłoga rusztowa: Należy potraktować równomiernie całą podłogę natychmiast po oczyszczeniu kanału z gnojowicy. Zabieg powtórzyć po każdym czyszczeniu lub gdy larwy much zostaną znalezione.</p> <p>Systemu typu pomieszczenie pełne / pomieszczenie puste: Należy potraktować poprzez posypywanie puste pomieszczenie natychmiast po oczyszczeniu z nawozu, przed wprowadzeniem świń</p> <p>Głęboka ściółka: potraktować poprzez rozpylenie lub polewanie około 3 dni po usunięciu obornika i powtórzyć zabieg po każdym usunięciu lub gdy larwy much zostaną znalezione. Potraktować całą powierzchnię obornika oraz mokre plamy wokół karmników i poidel.</p>	Ilość preparatu Neporex 2 SG do zastosowania na 10 m² powierzchni		
		Na sucho	Do polewania	Do opryskiwania
		250 g	250 g / 7,5 litra wody	250 / 2,5 litra wody
Drób				
	<p>Potraktować preparatem całą powierzchnię obornika 1 tydzień po jego usunięciu. Zabieg powtórzyć po każdym czyszczeniu lub gdy larwy much zostaną znalezione.</p>	Ilość preparatu Neporex 2 SG do zastosowania na 10 m² powierzchni		

			Mokra ściółka	Sucha ściółka	
			Na sucho	Do polewania	Do opryskiwania
			250 g	250 g / 7,5 litra wody	250 g / 2,5 litra wody

Inne obiekty rolnicze:

Ogólnie Neporex 2 SG jest stosowany na miejsca rozmnażania się much po 1 – 3 dniach gromadzenia się obornika. Drugie zastosowanie preparatu następuje po 2 tygodniach. Neporex 2 SG nie eliminuje dorosłych postaci much. Aby wyeliminować dorosłe postacie much należy natychmiast użyć kombinację produktu Neporex 2 SG z produktem działającym na dorosłe owady.