

노빈-50 (Novin-50 inj)



노빈-50은 해열, 진통, 진경작용을 합니다. 동물의 열성, 동통성 질환에 대증치료 및 보조치료제로 적합한 제제입니다.

1) 해열, 진통, 진경제에 대해 효과적입니다.

해열, 진통, 진경작용에 효과적인 피라졸론계 유도체인 메탐피론이 주성분입니다. 동물의 열성, 동통성 질환에 대증치료 및 보조치료제로 적합한 제제입니다.

2) 모든 동물에 작용합니다.

소, 말, 돼지, 양 등 축산동물뿐만 아니라 소동물인 개, 고양이에도 효과를 발휘합니다.

효능 및 효과

모든 동물의 열성, 동통성 질환의 진경, 진통, 해열작용

성분 및 함량

본제 1mL 중
Methampyrone
..... 500mg

포장단위
50mL

용법 및 용량

아래 용량을 1일 1~2회 근육 또는 피하 주사합니다.

- 가. 대동물 (소, 말): 5~20mL
- 나. 중동물 (돼지, 양): 5~10mL
- 다. 소동물 (개, 고양이): 0.5~2mL (체중 kg당 0.44mL)

주의사항

- * 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- * 본 약제에 대한 쇼크가 있었던 동물에게는 사용하지 마십시오.
- * [휴약기간] 소 28일, 우유 2일 / 말 28일 / 돼지 14일

저장방법/사용기간

- * 실온(1~30℃)의 어두운 곳에 보관하십시오.
- * 사용기간: 제조일로부터 24개월

