

# 오부레린 (Ovurelin inj)

처방대상 동물용의약품



오부레린은 합성 성선자극호르몬 방출호르몬 주사제로서, 성상은 무색의 투명한 액체입니다. PGF2α 제제와 함께 사용하여 소의 발정동기화, 배란 지연의 예방, 난소낭종의 치료 효과가 있습니다.

1) 소에서 오부프로스트(PGF2α)와 함께 사용하여 발정 동기화를 유도하면 번식력을 효과적으로 개선할 수 있습니다.

2) 소에서 배란지연의 예방 및 난소 낭종의 치료를 위해 사용할 수 있습니다.

## 효능 및 효과

가. 대상동물: 소

나. 발정동기화, 배란지연의 예방, 산후번식력의 개선, 난소낭종의 치료

## 성분 및 함량

본제 1mL 중  
Gonadorelin  
(GnRH) .....100µg

포장단위  
20mL

## 용법 및 용량

가. 소: 발정동기화 프로그램은 아래 절차를 따라 시행합니다.

- 0일: 본제 1mL 근육주사

- 7일: 오부프로스트 2mL 근육주사

- 9일: 본제 1mL 근육주사, 주사 후 8~24시간에 인공수정

나. 배란지연의 예방: 본제 2.5mL 근육주사

다. 산후 번식력 개선: 본제 2.5mL 근육주사

라. 난소 낭종: 본제 5mL 근육주사

## 주의사항

\* 수의사의 처방 및 지시에 따라 사용하십시오.

\* 사용설명서를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.

\* 본제를 사용시에는 반드시 보호장갑을 착용하시고 피부에 접촉한 경우에는 물과 비누로 즉시 씻어낸 후 이상증상을 느끼는 경우 제품 사용설명서를 지참하여 즉시 의사와 상담하십시오.

\* 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 사용하지 마십시오. 정해진 용법 용량을 준수하십시오.

\* 오남용 및 내성출현 예방을 위하여 동물약품의 사용내역을 빠짐없이 기록하여 주십시오.

\* [휴약기간] 없음

## 저장방법/유효기간

\* 직사광선을 피하여 실온(25°C 이하)에 보관하십시오.

\* 유효기간: 제조일로부터 24개월

