

## 부 표

업체명 : 한국엘랑코동물약품(주)

허가일자 : 2003. 07. 14.

허가번호 : 제 111-014 호

변경허가 : 2011. 03. 24.

제품명 : 타이란 설파-G (Tylan Sulfa G)

변경허가 : 2011. 11. 23.

2018. 02. 22.

2018. 12. 31.

2019. 05. 08.

2020. 11. 09.

### 1. 원료 약품 및 분량 (본제 1kg 중)

타일로신 인산염(Tylosin phosphate, 별규)-----100g (역가)

설파메타진(Sulfamethazine, 별규)-----100g (역가)

미네랄 오일(Mineral oil, 별규)-----적당량

대두피 (Soya Bean Mill Run, 별규) -----적당량

### 2. 제형 및 성상

산제, 갈색 가루

### 3. 제조 방법:

제조원의 제조방법에 따른다.

### 4. 효능 및 효과

타일로신과 설파메타진 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 예방 및 치료  
가. 돼지

- 예방 : 위축성비염(*Bordetella bronchiseptica*)의 예방

위축성비염(*Bordetella bronchiseptica*) 감염시 증체유지와 사료  
효율 개선

- 치료 : 세균성폐렴(*Pasteurella multocida*, *Actinomyces pyogens*)

## 5. 용법 및 용량

### 가. 돼지

- 위축성비염(예방) : 일일 사료 ton당 본제 1.1kg을 균일하게 혼합하여 28일간 경구투여
- 세균성폐렴(치료) : 일일 사료 ton당 본제 1.1kg을 균일하게 혼합하여 21일간 경구투여

## 6. 포장단위

1kg, 5kg, 10kg, 20kg, 22.68kg(50파운드)

## 7. 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 건조하고 햇빛이 비치지 않는 25℃ 이하에 보관.

나. 용기 종류: 밀폐용기

다. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

## 8. 주의사항

가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것.

본제 및 Macrolide계 항생제에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 동물에게 사용하지 마십시오.

나. 부작용

- (1)본제 성분 중 타일로신은 돼지의 직장부종, 설사 및 부분적 항문 탈장 등을 유발할 수 있습니다.
- (2)본제 성분 중 설파메타진은 결정뇨, 혈뇨, 요로폐쇄 등의 비뇨기계 장애를 유발 할 수 있습니다.
- (3)본제 성분 중 설파메타진은 과민반응에 의한 피부발진을 유발할 수 있습니다.
- (4)본제 성분 중 설파메타진은 장기간 투여 시 빈혈, 백혈구 감소증, 혈소판 감소증을 유발할 수 있습니다.

#### 다. 상호작용

Lincosamide계 및 다른 Macrolide계 항생제와 병용하지 마십시오.

#### 라. 적용상의 주의.

사료에 혼합하여 투여할 경우 균질하게 혼합되지 않으면 약화사고를 초래하거나 투여 목적을 달성할 수 없으므로 골고루 잘 혼합하여 사용하십시오.

#### 마. 휴약기간

돼지 : 15일

#### 바. 저장상의 주의사항

- (1) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
- (2) 유효성 및 안정성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.
- (3) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기 처리하십시오.
- (4) 개봉 후에는 가급적 빨리 사용하고 남은 것은 본래 포장용기를 밀봉하여 습기와 광선이 차단된 장소에 보관하십시오.
- (5) 다 쓴 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

#### 사. 기타 주의사항

- (1) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.
- (2) 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- (3) 주의사항을 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- (4) 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
- (5) 오남용 및 내성출현 예방을 위하여 동물약품의 사용내역을 빠짐없이 기록하여 주십시오.
- (6) 오남용에 의한 약화사고 및 축산식품에 잔류 등 경제적 손실을 초래할 수 있으므로 정해진 용법 용량을 준수하십시오.
- (7) 남용에 의해 약화사고와 경제적 손실을 초래할 수 있으므로 본제를 투여하면서 동시에 동일 성분의 약품을 중복투여하지 마십시오.

- (8) 휴약기간을 준수하지 않을 경우 축체에 약물이 잔류될 수 있으므로 시간까지 정확히 계산하여 준수하십시오.
- (9) 취급자는 장갑, 마스크, 보호의 등 보호장구를 착용하여 직접적인 피부 접촉이나 흡입을 피하여 주십시오.
- (10) 약품 취급시 피부나 눈에 접촉되었을 경우는 즉시 깨끗이 씻어 낸 후 이상증상이 발견되는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- (11) 제품에 대하여 문의하실 사항이 있으신 경우 수입사로 연락하여 주시기 바랍니다.

9. 기준 및 시험방법

- 가. 제품의 기준 및 시험방법 : 별첨
- 나. 원료의 기준 및 시험방법 : 별첨

10. 비고

- 가. 처방대상 동물용의약품
- 나. 제조국 : 영국
- 다. 제조사 : Rumenco Limited, Trading as Nettex  
(Eastern Avenue, Lichfield, Staffordshire, WS13 7SE, United Kingdom)