

## Neporex<sup>®</sup> 2 SG léglárvairtó granulátum

**Az irtószer neve:** Neporex<sup>®</sup> 2 SG léglárvairtó granulátum

**Gyártja:** Schirm AG, Division Sifokan, Baar-Ebenhausen, Németország

**Forgalomba hozza:** Elanco Tiergesundheit AG Magyarországi Fióktelepe, 1075 Budapest, Madách Imre út. 13-14

**Engedély száma:** 31198-5/2019/JIF

**Biocid terméktípus:** 18. terméktípus

**Termek minősítése:** III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer

**Összetétel:** Hatóanyaga: 2 % ciromazin (20 g/1 kg, CAS száma 66215-27-8)

**Hatásmechanizmus:** A Neporex<sup>®</sup> 2 SG rovarnövekedés szabályzóként hat, és befolyásolja a lárvák vedlési folyamatát. A felnőtt egyedeket nem pusztítja el. A felnőtt populáció létszámcsökkenése fokozatosan vehető észre, 1 - 2 héttel a kezelés után. Gyors felnőtt egyed létszámcsökkenést egyidejű adulticid alkalmazásával lehet elérni.

**Csomagolás:** 1 és 5 kg

### **Tárolás:**

Gyermekektől elzártn tartandó.

Eredeti zárt csomagolásban tároljuk 2°C - 30°C között. Óvjuk a közvetlen napfénytől és nedvességtől. Élelemiszertől, takarmánytól és hozamfokozóktól elkülönítve tárolandó.

### **Felhasználhatóság kártevők szerint:**

Állati trágyában fejlődő léglárvák irtására használható fel. A felnőtt legyeket nem pusztítja el. A felnőtt legyek létszámának csökkenése fokozatos, és 1 - 2 héttel a Neporex 2 SG alkalmazása után lesz látható. A felnőtt legyek gyors létszámcsökkentésére adulticid irtószerek egyidejű használata ajánlatos.

### **Használati utasítás:**

A Neporex<sup>®</sup> 2 SG léglárvairtó granulátum alkalmas kiszórásos, permetezéssel és öntözéssel történő kezelésre.

Részletes információért olvassa el a mellékelt utasítást.

### **Figyelmeztetés és elsősegély nyújtás:**

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó! Óvakodjunk attól, hogy a készítmény az itatókba, vagy a vályúkba kerüljön! Biogáz fejlesztésére használt trágya kezelésére használható! Munkavégzés után meleg, szappanos vízzel kezdet kell mosni. Ügyeljünk arra, hogy a permetet ne lélegezzük be, és ne kerüljön a szembe. Lenyeléskor azonnal forduljunk orvoshoz!

### **A dolgozók védelme:**

A termékkel dolgozók érintkezését a szerrel minimalisra kell csökkenteni. Ne lélegezzük be és ne nyeljük le. Kerüljük el a bőr, szem és ruházat érintkezését a szerrel. Kiszóráskor viseljünk védőkesztyűt.

Ne együnk, igyunk és ne dohányozzunk munkavégzés közben. Rosszullét esetén azonnal forduljunk orvoshoz. Belégzés esetén vigyük az érintettet friss levegőre és forduljunk orvoshoz. Bőrre kerülés esetén mossuk le szappannal és vízzel. Szembe jutás esetén alaposan öblítsük ki vízzel és forduljunk orvoshoz. Lenyelés: öblítsük ki a szájat vízzel és igyunk sok vizet.

**Ellenszer:**

Speciális ellenszer nem ismert, tüneti kezelést kell alkalmazni.

**A csomagolóanyag és a szermaradvány megsemmisítése:**

A termék csomagoló anyagát és maradványát kémiai anyagok megsemmisítésére kijelölt égetőben kell megsemmisíteni. Ne öntsük felületi vizekbe vagy szennyvíz hálózatba.

**HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A MELLÉKELT HASZNÁLATI UTASÍTÁST!**

- |      |  |
|------|--|
| H412 | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.             |
| P101 | Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. |
| P102 | Gyermekektől elzárva tartandó.   |
| P103 | Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.              |
| P273 | Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.                 |
| P501 | A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: égetőüzemben.               |

Gyártási szám:

Gyártási idő:

Felhasználható:

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### NEPOREX® 2 SG Ízeltlábúak növekedését szabályozó légylárvairtó granulátum

A Neporex® 2 SG légylárvairtó granulátum alkalmas kiszórásos, permetezési és öntözési kezelésre.

**Száraz kiszórás:** Szórjuk ki a Neporex® 2 SG-t egyenletesen a legyek tenyésztő helyeire. Akkor alkalmazzuk, ha a trágya nedves vagy vizes.

**Permetezés:** A javasolt mennyiséget keverjük el alaposan, a megfelelő vízmennyiséggel. Permetezzük ki a legyek tenyésztő helyeire.

**Öntözés:** Keverjük el alaposan a megadott Neporex® 2 SG mennyiségét a megfelelő vízmennyiséggel. Öntözzük szét egyenletesen a legyek tenyésztő helyein öntöző kannával.

**Általános javaslat:** Kezelés előtt állapítsuk meg a legyek tenyésztő helyeit és az összes helyet egyszerre kezeljük. A Neporex® 2 SG csak a legyek tenyésztő helyein alkalmazandó. A legyek pihenő helyein nem használható, mivel a felnőtt egyedekre nem hat.

#### Kezelési intervallumok:

A javasolt kezelési időpontok az istállózási rendszertől és az időjárási viszonyoktól függenek. 2 - 3 héttől több hónapos időközig terjedhet. Pontosabb információt az alábbi táblázat nyújt.

#### 1. linija

Borjú nevelők	Neporex® 2 SG mennyisége 20 m x 50 cm csíkok (10 m <sup>2</sup> ) kezelésére	
<b>Mélyalom:</b> Kezeljük a falak mentén kb 50 cm széles csíkot az etető és itató berendezések körül és alatt, valamint azokat az alomrészeket, amiket nem tapostak keményre az állatok, és ahol az alom átnedvesedett. <b>Külső borjúkarámokban:</b> Kezeljük az egész felületet. Ismételjük meg a kezelést minden kialmozás után vagy amikor lárvák jelennek meg az alomban. Alkalmazzuk a Neporex® 2 SG-t permetezéssel vagy öntözéssel 3 nappal kialmozás után és ismételjük meg minden újabb takarítás után, vagy amikor légylárvák jelennek meg.	Öntözés	Permetezés
	250 g/7,5 liter víz	250 g/2,5 liter víz

#### 2. linija

Borjak rácspadozaton	Neporex® 2 SG mennyisége 10 m <sup>2</sup> felület kezelésére
Kezeljük egyenletesen az egész felületet a trágyaaknában kialmozás után azonnal. Ismételjük meg a kezelést a következő kialmozáskor vagy ha	<b>Száraz kiszórás:</b> 250 g

légylárvák jelennek meg.	
--------------------------	--

### 3. linija

<b>Sertés istállók</b>	<b>Neporex® 2 SG mennyisége 10 m<sup>2</sup> kezelésére</b>		
<b>Rácpadozat:</b> Kezeljük az egész trágyaakna felületet azonnal kitrágyázás után. Ismételjük meg a kezelést minden újabb kitrágyázás után, vagy ha légylárvák jelennek meg. <b>Egyszerre ürítés – telepítéses rendszerben:</b> Leginkább kiszórással kezeljük, azonnal takarítás után a malacok betelepítése előtt. <b>Mélyalmos rendszerben:</b> Permetezéssel vagy öntözéssel kezeljük kb 3 nappal a trágya eltávolítása után és ismételjük meg a kezelést minden kitrágyázás után vagy ha lárvák jelennek meg. Kezeljük az egész trágyafelületet és a nedves helyeket az etetők és itatók körül.	<b>Száraz szórás</b>	<b>Öntözés</b>	<b>Permetezés</b>
	250 g	250 g/7,5 l víz	250 g/2,5 l víz

### 4. linija

<b>Baromfi istállók</b>	<b>Neporex® 2 SG mennyisége 10 m<sup>2</sup> kezelésére</b>		
Kezeljük az egész trágya felületet 1 héttel a trágya eltávolítás után. Ismételjük meg a kezelést minden kitrágyázás után, vagy ha légylárvák jelennek meg.	<b>Nedves alom</b>	<b>Száraz alom</b>	
	<b>Száraz szórás</b>	<b>Öntözés</b>	<b>Permetezés</b>
	250 g	250 g/7,5 l víz	250 g /2,5 l víz

#### **Egyéb mezőgazdasági objektumok:**

Általában Neporex® 2 SG alkalmazandó a legyek tenyészhelyein 1 - 3 nappal az anyag felhalmozódása után. 2 hét múlva a kezelés megismétlendő.

A Neporex® 2 SG nem pusztítja el a kifejlett legyeket. A kifejlett egyedek azonnali elpusztítására a Neporex® 2 SG-vel való kezelést adulticid szerekkel történő kezeléssel kell kombinálni.