Tabelle 3.1.1 - Screening für früherkennung von Zervixkarzinom. Südtirol - Jahr 2012

Altersklassen	Ziel-bevölkerung	Eingeladene Frauen	Einladungsrate %	Teilnehmende Frauen	Teilnahmerate %	Zellen eines Zervixkarzinoms	Schwere Dysplasie (HSIL)
23-24	1.845	2.601	141,0%	782	30,1%	-	4
25-29	4.751	3.661	77,1%	1.261	34,4%	-	9
30-34	5.429	4.459	82,1%	1.716	38,5%	-	11
35-39	6.096	5.034	82,6%	1.969	39,1%	-	5
40-44	7.039	5.422	77,0%	2.133	39,3%	-	6
45-49	7.022	5.115	72,8%	2.034	39,8%	-	5
50-54	6.017	4.200	69,8%	1.781	42,4%	-	0
55-59	4.982	3.288	66,0%	1.478	45,0%	-	0
60-64	4.545	3.188	70,1%	1.383	43,4%	-	0
65	922	869	94,3%	319	36,7%	-	0
Insgesamt	**48.648**	**37.837**	**77,8%**	**14.856**	**39,3%**	**-**	**40**
% an Teilnehmenden						**-**	**0,27%**

Quelle: Tumorregister Südtirol

Tabelle 3.1.1 - Screening für früherkennung von Zervixkarzinom. Südtirol - Jahr 2012

Altersklassen	leichten oder mäßigen Dysplasie (LSIL)	Atypische Plattenepithelzellen (ASC-H)	Atypische Plattenepithelzellen unklarer Bedeutung (ASC-US)	Atypische Drüsenzellen (ACG)	Kein Anhalt für intraepitheliale Läsion oder Malignität	Unzureichende Abstriche
23-24	53	0	0	0	721	4
25-29	63	2	2	0	1177	8
30-34	48	2	2	1	1635	17
35-39	35	1	2	0	1911	15
40-44	40	0	2	2	2060	23
45-49	22	1	2	1	1981	22
50-54	17	3	2	1	1705	53
55-59	7	1	4	2	1384	80
60-64	6	0	1	1	1299	76
65	1	0	1	0	298	19
Insgesamt	**292**	**10**	**18**	**8**	**14171**	**317**
% an Teilnehmenden	**1,97%**	**0,07%**	**0,12%**	**0,05%**	**94,39%**	**2,13%**

Quelle: Tumorregister Südtirol