*Tabelle 2.2.14 - Standardisierte durchschnittliche jährliche Inzidenz- und Sterblichkeitssraten der bösartigen Tumoren nach Geschlecht. Sütirol, Raten pro 100.000*

| | | Inzidenz (2017-21) | | Sterblichkeit (2019-23) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICD X | Lokalisation | Männer | Frauen | Männer | Frauen |
| C00-C10,C12-C14 | Mundhohle und Rachen | 20,3 | 6,8 | 6,1 | 2,2 |
| C11,C30-C31 | Rhinopharynx und Nasenhöhlen | 3,4 | 0,9 | 0,8 | 0,2 |
| C15 | Speiseröhre | 8,9 | 2,1 | 5,8 | 1,6 |
| C16 | Magen | 23 | 13,7 | 15,8 | 7,7 |
| C17 | Dünndarm | 3,8 | 2,7 | 0,7 | 1,0 |
| C18-C20,C26.0 | Kolon und Rektum | 70,3 | 45,7 | 27,7 | 17,0 |
| C21 | After | 1,0 | 3,1 | 0,1 | 0,8 |
| C22 | Leber und intrahepatische Gallengänge | 27,1 | 7,5 | 20,8 | 6,9 |
| C23-C24 | Gallenwege | 7,7 | 7,1 | 3,9 | 3,8 |
| C25 | Bauchspeicheldrüse | 24,2 | 19,5 | 19,7 | 15,9 |
| C32 | Kehlkopf | 6,6 | 0,6 | 2,1 | 0,3 |
| C33-C34 | Luftröhre, Bronchien, Lungen | 64,1 | 35,0 | 48,3 | 23,5 |
| C37,C38.0-C38.4 | Andere Thoraxorgane | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,1 |
| C40-C41 | Knochen | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
| C43 | Haut, Melanom | 27,5 | 23,3 | 3,6 | 2,5 |
| C44 | Haut, nicht-Melanom | 85,8 | 52,4 | 1,6 | 0,6 |
| C45 | Mesotheliom | 2,9 | 0,7 | 2,1 | 0,6 |
| C46 | Kaposisarkom | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| C47,C49 | Weichteile | 3,6 | 2,5 | 1,8 | 1,0 |
| C48 | Retroperitoneum, Peritoneum | 0,5 | 2,1 | 0,1 | 0,6 |
| C50 | Brust | 1,1 | 136 | 0,3 | 25,3 |
| C51-C52,C57.7-C57.9 | Sonstige weibliche Geschlechtsorgane | | 4,8 | | 1,2 |
| C53 | Gebärmutterhals | | 8,5 | | 1,8 |
| C54-C55 | Gebärmutterkörper und n.a.d. | | 20,8 | | 4,9 |
| C56,C57.0-C57.4 | Eierstock | | 16,6 | | 11,3 |
| C60,C63 | Penis und sonstige männliche Geschlechtsorgane | 1,8 | | 0,3 | |
| C61 | Prostata | 167,9 | | 26,1 | |
| C62 | Hoden | 10,7 | | 0,0 | |
| C64 | Niere | 22,0 | 9,9 | 5,7 | 2,7 |
| C65-C68,D09.0,D41.4 | Blase, Nierenbecken und andere Harnwege | 70,9 | 14,8 | 14,5 | 3,4 |
| C69 | Auge | 1,0 | 1,4 | 0,3 | 0,2 |
| C70-C72 | Großhirn und ZNS | 11,0 | 6,8 | 6,9 | 5,2 |
| C73 | Schilddrüse | 5,7 | 14,3 | 1,0 | 1,0 |
| C74-C75 | Andere endokrine Drüsen | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
| C81 | Hodgkin-Lymphom | 4,2 | 3,0 | 0,7 | 0,3 |
| C82-C86,C96 | Non-Hodgkin-Lymphom | 23,4 | 12,7 | 9,1 | 3,6 |
| C88 | Bösartige immunoproliferative Krankeiten | 3,7 | 2,5 | 0,2 | 0,1 |
| C90.0,C90.2 | Multiples Myelom | 7,8 | 6,8 | 4,1 | 3,2 |
| C90.1,C91-C95 | Leukämie | 16,6 | 11,1 | 8,2 | 5,4 |

*Tabelle 2.2.14 - Standardisierte durchschnittliche jährliche Inzidenz- und Sterblichkeitssraten der bösartigen Tumoren nach Geschlecht. Sütirol, Raten pro 100.000*

| | | Inzidenz (2017-21) | | Sterblichkeit (2019-23) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ICD X** | **Lokalisation** | **Männer** | **Frauen** | **Männer** | **Frauen** |
| D45-D47 | Myeloproliferative Erkrankungen und myelodisplastische Syndrome | 16,6 | 10,5 | 4,5 | 1,9 |
| | Schlecht def. Lokalisationen ** | 8,5 | 6,2 | 10,5 | 7,5 |
| | **Alle Lokalisationen** | **757,8** | **514,8** | **254,9** | **165,9** |

Quelle: Landessterblichkeitsregister

Bemerkung:
** umfasst die Kodizes ICD X: C26.1-C26.9, C38.8, C39, C76-C80, C97