


Alkoholkonsum

Bevölkerungsüberwachungen
Passi und Passi d'Argento
Dati 2022-23

in Südtirol

Im Zeitraum 2022-2023 gaben 3 von 4 Erwachsenen zwischen 18 und 69 Jahren und etwas mehr als 4 von 10 Senioren an, alkoholische Getränke zu konsumieren. 1 von 4 Erwachsenen und 1 von 5 Senioren konsumieren Alkohol in einer Weise, die aufgrund der Menge oder der Art des Konsums als gesundheitsschädlich definiert wird.

Gesundheitsschädlicher Alkoholkonsum nach Altersklassen




Der gesundheitsschädliche Konsum nimmt mit dem Alter ab: 72 % der 18- bis 24-Jährigen gegenüber 13 % der über 80-Jährigen. Sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Senioren ist der riskante Konsum bei den Männern wesentlich häufiger. Der Anteil der Männer mit gesundheitsschädlichem Konsum sinkt von 48 % auf 31 % und bei den Frauen von 30 % auf 9 %.

Gesundheitsschädlicher Alkoholkonsum nach Geschlecht

Erwachsene



Senioren



Erwachsene

Binge Drinking wird von 20 % der Erwachsenen praktiziert (≥ 5 Alkoholeinheiten (AE) bei einer Gelegenheit bei Männern und ≥ 4 AE bei Frauen), 28 % konsumieren Alkohol ausschließlich oder überwiegend außerhalb der Mahlzeiten und 2 % haben einen hohen Gewohnheitskonsum (≥ 3 tägliche AE bei Männern und ≥ 2 AE bei Frauen).

Binge Drinking



Außerhalb der Mahlzeiten




Hoher Gewohnheitskonsum




Senioren

1 von 4 Senioren gehört zu den mäßigen Trinkern, d.h. durchschnittlich weniger als 1 AE pro Tag. Einen gesundheitsschädlichen Konsum von durchschnittlich mehr als einer AE pro Tag wird von 19 % der Senioren angegeben.



Jährlicher Trend des gesundheitsschädlichen Alkoholkonsums



Im letzten Zweijahreszeitraum ist der Anteil der Erwachsenen und Senioren mit gesundheitsschädlichem Konsum gestiegen.

Patienten mit Lebererkrankung

Konsum von Alkohol



Gesundheitsschädlicher Konsum



Besorgniserregend ist die hohe Zahl von Erwachsenen und Senioren, die trotz absoluter Kontraindikation Alkohol konsumieren.