Tabelle 2.2.13 - Durchschnittliche jährliche Inzidenzraten der bösartigen Tumoren nach Geschlecht. Sütirol, Raten pro 100.000 - Jahre 2001-2005*

		unbereinigte Raten		standardisierte Raten (EU)	
ICD X	**Lokalisation**	**Männer**	**Frauen**	**Männer**	**Frauen**
C00-C10,C12-C14	Mundhohle und Rachen	26,2	7,8	24,4	6,4
C11,C30-C31	Rhinopharynx und Nasenhöhlen	2,7	0,7	2,6	0,6
C15	Speiseröhre	10,0	2,2	9,0	1,7
C16	Magen	33,1	24,8	28,5	15,1
C17	Dünndarm	1,8	1,5	1,6	1,2
C18-C20,C26.0	Kolon und Rektum	74,6	55,2	65,0	36,5
C21	After	0,9	2,9	0,9	1,9
C22	Leber und intrahepatische Gallengänge	21,6	5,4	19,3	3,5
C23-C24	Gallenwege	5,3	9,7	4,7	6,2
C25	Bauchspeicheldrüse	14,2	15,9	12,5	10,1
C32	Kehlkopf	10,0	1,2	9,1	0,9
C33-C34	Luftröhre, Bronchien, Lungen	58,1	22,9	50,0	16,0
C37,C38.0-C38.4	Andere Thoraxorgane	1,0	0,5	0,9	0,4
C40-C41	Knochen	0,9	0,8	0,9	0,7
C43	Haut, Melanom	21,3	24,0	19,7	20,1
C44	Haut, nicht-Melanom	28,3	23,4	24,4	12,8
C45	Mesotheliom	1,6	0,3	1,5	0,2
C46	Kaposisarkom	0,5	0,4	0,4	0,2
C47,C49	Weichteile	2,8	2,4	2,8	1,9
C48	Retroperitoneum, Peritoneum	0,8	1,3	0,7	1,0
C50	Brust	1,0	121,2	1,0	99,7
C51-C52,C57.7-C57.9	Sonstige weibliche Geschlechtsorgane	-	3,8	-	2,4
C53	Gebärmutterhals	-	10,0	-	8,9
C54-C55	Gebärmutterkörper und n.a.d.	-	22,7	-	17,8
C56,C57.0-C57.4	Eierstock	-	16,1	-	12,5
C58	Plazenta	-	-	-	-
C60,C63	Penis und sonstige männliche Geschlechtsorgane	1,0	-	0,9	-
C61	Prostata	152,6	-	133,7	-
C62	Hoden	8,2	-	7,5	-
C64	Niere	17,6	10,4	15,6	7,5
C65-C68,D09.0,D41.4	Blase, Nierenbecken und andere Harnwege	57,6	14,9	49,4	9,6
C69	Auge	0,5	1,0	0,5	0,9
C70-C72	Großhirn und ZNS	8,0	6,7	7,2	5,2
C73	Schilddrüse	3,4	9,2	3,1	8,1
C74-C75	Andere endokrine Drüsen	0,5	0,3	0,6	0,2
C81	Hodgkin-Lymphom	2,9	2,3	2,8	2,4
C82-C85,C96	Non-Hodgkin-Lymphom	18,0	13,9	15,9	10,3
C88	Bösartige immunoproliferative Krankeiten	0,6	0,1	0,5	0,1
C90.0,C90.2	Multiples Myelom	4,4	5,3	4,0	3,3
C90.1,C91-C95	Leukämie	12,1	10,4	10,9	7,0
D45-D47	Myeloproliferative Erkrankungen und myelodisplastische Syndrome	5,0	4,7	4,2	3,2

Tabelle 2.2.13 - Durchschnittliche jährliche Inzidenzraten der bösartigen Tumoren nach Geschlecht. Sütirol, Raten pro 100.000 - Jahre 2001-2005*

ICD X	Lokalisation	unbereinigte Raten		standardisierte Raten (EU)	
		Männer	Frauen	Männer	Frauen
	Schlecht def. Lokalisationen **	10,7	9,9	9,5	5,3
	Alle Lokalisationen	**620,1**	**465,7**	**545,8**	**341,7**

Quelle: Landessterblichkeitsregister

Bemerkungen:

* provisorische Daten für die Jahre 2004 u. 2005

** umfasst die Kodizes ICD X: C26.1-C26.9, C38.8, C39, C76-C80, C97