***Tabelle 2.1.7 - Prävalenz und Inzidenz der von den DfA versorgten DA-Patienten nach Gesundheitsbezirk. Südtirol. Werte pro 1.000 und 10.000 Einwohner 15-54 Jahre - Jahre 2010-2014***

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Prävalenz insgesamt (x1.000)** | | | | | |
| Bozen | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 3,8 |
| Meran | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| Brixen | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| Bruneck | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
| **Insgesamt** | **2,8** | **3,0** | **2,9** | **2,9** | **2,8** |
| **Inzidenz insgesamt (x10.000)** | | | | | |
| Bozen | 4,5 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 1,6 |
| Meran | 3,5 | 1,4 | 2,9 | 3,8 | 3,3 |
| Brixen | 2,4 | 2,0 | 1,5 | 2,4 | 2,4 |
| Bruneck | 1,9 | 2,8 | 2,3 | 1,2 | 3,0 |
| **Insgesamt** | **3,6** | **1,9** | **2,1** | **2,5** | **2,4** |

Quelle: Südtiroler Sanitätsbetrieb - DfA