***Tabelle 2.2.14 - Durchschnittl. jährliche Todesfälle aufgrund von bösartigen Tumoren in der männlichen Wohnbevölkerung. Südtirol, Raten pro 100.000 - Jahre 2003-2007***

| ICD X | Lokalisation | Todesfälle | Unbereinigte Rate | Stand. Rate (EU) | Schätzung 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| C00-C10,C12-C14 | Mundhohle und Rachen | 30 | 12,5 | 11,3 | 38 |
| C11,C30-C31 | Rhinopharynx und Nasenhöhlen | 2 | 0,9 | 0,9 | 3 |
| C15 | Speiseröhre | 20 | 8,5 | 7,1 | 25 |
| C16 | Magen | 51 | 21,5 | 17,6 | 65 |
| C17 | Dünndarm | 1 | 0,6 | 0,5 | 2 |
| C18-C20,C26.0 | Kolon und Rektum | 74 | 31,0 | 25,8 | 96 |
| C21 | After | 1 | 0,4 | 0,3 | 1 |
| C22 | Leber und intrahepatische Gallengänge | 44 | 18,6 | 15,5 | 55 |
| C23-C24 | Gallenwege | 13 | 5,5 | 4,5 | 17 |
| C25 | Bauchspeicheldrüse | 40 | 16,7 | 13,9 | 51 |
| C32 | Kehlkopf | 6 | 2,6 | 2,3 | 8 |
| C33-C34 | Luftröhre, Bronchien, Lungen | 132 | 55,5 | 45,3 | 166 |
| C37,C38.0-C38.4 | Andere Thoraxorgane | 3 | 1,1 | 0,9 | 3 |
| C40-C41 | Knochen | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| C43 | Haut, Melanom | 4 | 1,9 | 1,6 | 6 |
| C44 | Haut, nicht-Melanom | 2 | 0,8 | 0,8 | 3 |
| C45 | Mesotheliom | 4 | 1,6 | 1,3 | 4 |
| C46 | Kaposisarkom | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| C47,C49 | Weichteile | 2 | 0,8 | 0,7 | 2 |
| C48 | Retroperitoneum, Peritoneum | 2 | 0,8 | 0,7 | 2 |
| C50 | Brust | 1 | 0,3 | 0,2 | 1 |
| C60,C63 | Penis und sonstige männliche Geschlechtsorgane | 1 | 0,6 | 0,5 | 2 |
| C61 | Prostata | 64 | 26,7 | 21,6 | 91 |
| C62 | Hoden | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| C64 | Niere | 16 | 6,7 | 5,5 | 20 |
| C65-C68,D09.0,D41.4 | Blase, Nierenbecken und andere Harnwege | 36 | 15 | 12,3 | 48 |
| C69 | Auge | 1 | 0,4 | 0,3 | 1 |
| C70-C72 | Großhirn und ZNS | 15 | 6,5 | 5,7 | 18 |
| C73 | Schilddrüse | 2 | 0,9 | 0,7 | 3 |
| C74-C75 | Andere endokrine Drüsen | 1 | 0,3 | 0,3 | 1 |
| C81 | Hodgkin-Lymphom | 2 | 0,7 | 0,5 | 2 |
| C82-C85,C96 | Non-Hodgkin-Lymphom | 14 | 6,0 | 4,9 | 18 |
| C88 | Bösartige immunoproliferative Krankeiten | 1 | 0,5 | 0,4 | 2 |
| C90.0,C90.2 | Multiples Myelom | 8 | 3,4 | 2,7 | 10 |
| C90.1,C91-C95 | Leukämie | 24 | 9,9 | 8,4 | 31 |
| D45-D47 | Myeloproliferative Erkrankungen und myelodisplastische Syndrome | 6 | 2,6 | 2,2 | 9 |
| | Schlecht def. Lokalisationen ** | 22 | 9,3 | 7,6 | 28 |

*Tabelle 2.2.14 - Durchschnittl. jährliche Todesfälle aufgrund von bösartigen Tumoren in der männlichen Wohnbevölkerung. Südtirol, Raten pro 100.000 - Jahre 2003-2007*

| ICD X | Lokalisation | Todesfälle | Unbereinigte Rate | Stand. Rate (EU) | Schätzung 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Alle Lokalisationen** | **647** | **271,5** | **225,4** | **832** |

Quelle: Landessterblichkeitsregister

Bemerkung:
** umfasst die Kodizes ICD X: C26.1-C26.9, C38.8, C39, C76-C80, C97