***Tabelle 2.2.18 - Prozentsatz der von der diabetischen Bevölkerung durchgeführten Diagnoseuntersuchungen - Jahr 2013***

| | % Typ 1 Diabetiker | | % Typ 2 Diabetiker | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnoseuntersuchung | % der_Diabetiker mit durchgef. Diagnoseuntersuchung | Durchschnittliche jährliche Anzahl der Untersuchungen | % der_Diabetiker mit durchgef. Diagnoseuntersuchung | Durchschnittliche jährliche Anzahl der Untersuchungen |
| Kreatinin | 90,3% | 2,4 | 73,9% | 2,0 |
| Glykohämoglobin | 84,8% | 2,9 | 74,6% | 2,7 |
| Gesamtcholesterin | 84,7% | 2,0 | 66,2% | 1,6 |
| Triglyzeride | 84,1% | 2,0 | 65,0% | 1,6 |
| Urin- Untersuchung | 59,8% | 2,2 | 60,3% | 1,9 |
| HDL-Cholesterin | 69,0% | 1,7 | 53,7% | 1,4 |
| Elektrokardiogramm(EKG) | 40,3% | 1,1 | 34,4% | 1,3 |
| Mikroalbuminurie | 71,0% | 1,5 | 39,7% | 1,4 |

Quelle: Epidemiologische Beobachtungsstelle - Mapping der chronischen Krankheiten