Tabelle 3.1.1 - Screening für früherkennung von Zervixkarzinom. Südtirol - Jahr 2013

Altersklassen	Ziel-bevölkerung	Eingeladene Frauen	Einladungsrate %	Teilnehmende Frauen	Teilnahmerate %	Zellen eines Zervixkarzinoms	Schwere Dysplasie (HSIL)
23-24	1.858	3672	197,6%	1.245	33,9%	-	2
25-29	4.687	6195	132,2%	1.757	28,4%	-	10
30-34	5.335	6877	128,9%	2.271	33,0%	-	5
35-39	5.846	7313	125,1%	2.796	38,1%	-	6
40-44	6.857	8503	124,0%	3.325	39,1%	-	3
45-49	7.057	8846	125,4%	3.221	36,4%	1	6
50-54	6.231	7830	125,7%	2.936	37,5%	-	1
55-59	5.096	5904	115,9%	2.191	37,1%	-	3
60-64	4.523	4583	101,3%	1.560	34,0%	-	2
65	923	619	124,6%	114	18,4%	-	0
Insgesamt	**48.414**	**30.342**	**122,8%**	**21.416**	**35,5%**	**1**	**38**
% an Teilnehmenden						**0,005%**	**0,18%**

Quelle: Tumorregister Südtirol

Tabelle 3.1.1 - Screening für früherkennung von Zervixkarzinom. Südtirol - Jahr 2013

Altersklassen	leichten oder mäßigen Dysplasie (LSIL)	Atypische Plattenepithelzellen (ASC-H)	Atypische Plattenepithelzellen unklarer Bedeutung (ASC-US)	Atypische Drüsenzellen (ACG)	Kein Anhalt für intraepitheliale Läsion oder Malignität	Unzureichende Abstriche
23-24	68	0	0	0	1.168	7
25-29	54	2	3	0	1.672	16
30-34	55	3	0	0	2.198	10
35-39	63	5	2	2	2.700	18
40-44	54	3	2	1	3.234	28
45-49	47	3	2	1	3.130	31
50-54	28	3	2	0	2.850	52
55-59	13	1	2	0	2.092	80
60-64	8	1	0	0	1.485	64
65	1	0	0	0	105	8
Insgesamt	**391**	**21**	**13**	**4**	**20.634**	**314**
% an Teilnehmenden	**1,83%**	**0,10%**	**0,06%**	**0,02%**	**96,35%**	**1,47%**

Quelle: Tumorregister Südtirol