Tabelle 3.2.1 - Impfkalender für das Jahr 2013

Imfung	Geburt	3. Monat	5. Monat	11. Monat	13.-15. Monat	Mit 6 Jahren	Mit 11-18 Jahren	Auffrischimpfung alle 10 Jahre
DTaP		DTaP	DTaP	DTaP		dTap	dTap	dTap
IPV		IPV	IPV	IPV		IPV		
HB	HB*	HB	HB	HB				
Hib		Hib	Hib	Hib				
MMR					MMR 1	MMR 1/2**	MMR 1/2**	
Pneumo		PCV13	PCV13	PCV13				
Varizellen					Var***		Var	
HPV							HPV	
Meningokokken					Men C/Men B****		Men ACWY°	
Influenza°°								

DTaP: Impfstoff gegen Diphtherie, Tetanus und Pertussis

dTap: Impfstoff gegen Diphtherie, Tetanus und Pertussis für Erwachsene

IPV: Inaktivierter Impfstoff gegen Kinderlähmung-SALK, intramuskulär

HB: Impfstoff gegen Hepatitis B

Hib: Impfstoff gegen Erkrankungen durch Haemophilus influenzae Typ b

MMR: Impfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln

PCV13: Impfstoff gegen Erkrankungen durch Pneumokokken

Var: Impfstoff gegen Varizellen

HPV: Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs

Men C: Impfstoff gegen Erkrankungen durch Meningokokken C

Tabelle 3.2.1 - Impfkalender für das Jahr 2013

Imfung	Geburt	3. Monat	5. Monat	11. Monat	13.-15. Monat	Mit 6 Jahren	Mit 11-18 Jahren	Auffrischimpfung alle 10 Jahre
*** Neugeborenen, deren Mütter HbsAg positiv sind: die 1. Dosis wird innerhalb der ersten 12-24 Stunden nach der Geburt, gleichzeitig mit spezifischen Anti-Hepatitis B Immunglobuline verabreicht.**								
**** Mit 6 Jahren sollte die 2. Dosis angeboten werden, zusammen mit der IPV- und DTaP-Auffrischungsimpfung, bzw. den bis dahin noch nicht MMR-geimpften Kindern die 1. Dosis.**								
**** Mit 11 bis 18 Jahren sollten Letztere die 2. Dosis erhalten, bzw. bis dahin MMR-Ungeimpfte die 1. und 2. Dosis, in einem Abstand, der den vorgegeben technischen Daten des Impfstoffes entspricht.**								
***** Für Kinder, die den Kinderhort oder ähnliche Strukturen besuchen**								
****** Sobald der Impfstoff zur Verfügung steht, entsprechend der vorgegeben technischen Daten des Impfstoffes.**								
° Nichtgeimpften, wird im Alter von 11-18 Jahren die Verabreichung einer Dosis empfohlen (konjugierter Vierfach Impfstoff)								
°° Für Risikogruppen, die im jährlichen Rundschreiben des Gesundheitsministerium angeführt werden.								