Tabelle 2.2.14 - Durchschnittl. jährliche Todesfälle aufgrund von bösartigen Tumoren in der männlichen Wohnbevölkerung. Südtirol, Raten pro 100.000 - Jahre 2001-2005

ICD X	Lokalisation	Todesfälle	Unbereinigte Rate	Stand. Rate (EU)	Schätzung 2009
C00-C10,C12-C14	Mundhohle und Rachen	27	11,5	10,5	32
C11,C30-C31	Rhinopharynx und Nasenhöhlen	2	0,9	0,9	2
C15	Speiseröhre	18	7,9	6,8	21
C16	Magen	51	22,0	18,6	62
C17	Dünndarm	2	0,8	0,6	2
C18-C20,C26.0	Kolon und Rektum	73	31,4	27,1	88
C21	After	1	0,4	0,4	1
C22	Leber und intrahepatische Gallengänge	41	17,6	15,4	48
C23-C24	Gallenwege	12	5,3	4,6	15
C25	Bauchspeicheldrüse	31	13,2	11,5	37
C32	Kehlkopf	8	3,5	3,0	10
C33-C34	Luftröhre, Bronchien, Lungen	126	54,1	45,8	151
C37,C38.0-C38.4	Andere Thoraxorgane	2	0,9	0,8	3
C40-C41	Knochen	1	0,3	0,3	1
C43	Haut, Melanom	5	2,2	2,0	6
C44	Haut, nicht-Melanom	2	0,7	0,6	2
C45	Mesotheliom	3	1,5	1,3	4
C46	Kaposisarkom	0	0,0	0,0	0
C47,C49	Weichteile	1	0,6	0,5	2
C48	Retroperitoneum, Peritoneum	1	0,6	0,6	2
C50	Brust	1	0,3	0,2	1
C60,C63	Penis und sonstige männliche Geschlechtsorgane	1	0,3	0,4	1
C61	Prostata	65	27,7	23,8	84
C62	Hoden	0	0,2	0,2	0
C64	Niere	16	6,9	6,0	20
C65-C68,D09.0,D41.4	Blase, Nierenbecken und andere Harnwege	31	13,1	11,4	38
C69	Auge	1	0,3	0,3	1
C70-C72	Großhirn und ZNS	15	6,3	5,5	17
C73	Schilddrüse	3	1,3	1,1	4
C74-C75	Andere endokrine Drüsen	0	0,2	0,1	1
C81	Hodgkin-Lymphom	1	0,4	0,3	1
C82-C85,C96	Non-Hodgkin-Lymphom	15	6,4	5,6	18
C88	Bösartige immunoproliferative Krankeiten	1	0,5	0,5	2
C90.0,C90.2	Multiples Myelom	8	3,5	3,0	10
C90.1,C91-C95	Leukämie	20	8,6	7,5	24
D45-D47	Myeloproliferative Erkrankungen und myelodisplastische Syndrome	5	2,1	1,7	6
	Schlecht def. Lokalisationen **	22	9,5	8,2	27
	Alle Lokalisationen	**613**	**263,1**	**226,8**	**743**

Quelle: Landessterblichkeitsregister

Bemerkung:
** umfasst die Kodizes ICD X: C26.1-C26.9, C38.8, C39, C76-C80, C97