Tabelle 3.2.1 - Impfkalender für das Jahr 2009

Imfung	3. Monat	5. Monat	11. Monat	13.-15. Monat	Mit 6 Jahren	Im 12. LJ	Mit 11-15 Jahren
DTaP	DTaP	DTaP	DTaP		DTaP		dTap***
IPV	IPV	IPV	IPV		IPV		
HB****	HB	HB	HB				
Hib	Hib	Hib	Hib				
MMR				MMR 1	MMR 1/2*		MMR 1/2**
Pneumo°°°	Pneumo	Pneumo	Pneumo				
Varizellen				Varizellen°	Varizellen°		Varizellen°°
HPV						HPV	
Meningokokken C				Meningok.C			

DTaP: Impfstoff gegen Diphtherie, Tetanus und Pertussis

dTap: Impfstoff gegen Diphtherie, Tetanus und Pertussis für Erwachsene

IPV: Inaktivierter Impfstoff gegen Kinderlähmung–SALK, intramuskulär

HB: Impfstoff gegen Hepatitis B

Hib: Impfstoff gegen Erkrankungen durch Haemophilus influenzae Typ b

MMR: Impfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln

Pneumo: Impfstoff gegen Erkrankungen durch Pneumokokken

Varizellen: Impfstoff gegen Varizellen

HPV: Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs

Meningokokken C: Impfstoff gegen Erkrankungen durch Meningokokken C

*** Mit 6 Jahren sollte die 2. Dosis angeboten werden, zusammen mit der IPV- und DTaP-Auffrischungsimpfung, bzw. den bis dahin noch nicht MMR-geimpften Kindern die 1. Dosis (MMR 1/2*).**

**** Mit 11 bis 15 Jahren sollten die Kinder die 2. Dosis erhalten, bzw. bis dahin MMR-Ungeimpfte die 1. Dosis (MMR 1/2**).**

***** Nach diesem Alter wird eine Auffrischung alle 10 Jahre der Diphtherie-Tetanus-Impfung (dT) empfohlen. Die Keuchhusten-Impfung kann unabhängig von vorhergegangenen Keuchhusten-Impfungen verabreicht werden**

****** Neugeborene, deren Mütter Virusträger sind, müssen sofort nach der Geburt geimpft werden**

° Für Risikogruppen

°° Für Nichtgeimpfte und Nichterkrankte

°°° Kindern, die mit der Pneumokokkenimpfung erst zwischen dem 12. und 23. LM beginnen erhalten 2 Impfdosen im Mindestabstand von zwei Monaten. Kinder, die das zweite Lebenjahr bereits abgeschlossen haben, erhalten eine Einzeldosis