

Die nächsten beiden Abschnitte behandeln die grundlegenden Risikofaktoren für die Gesundheit der Bevölkerung und beschreiben die Aspekte der Morbidität und Mortalität der wichtigsten Krankheiten.

Der Gesundheitszustand einer Bevölkerung ist schwer erfassbar und hängt nicht nur vom Angebot der Gesundheitsleistungen und sonstigen Diensten ab, sondern auch von zahlreichen biologischen, umweltbedingten und kulturellen Faktoren. Neben den traditionellen Indikatoren zur Beschreibung des Gesundheitszustandes einer Bevölkerung wie Lebenserwartung bei der Geburt und Kindersterblichkeitsrate wird in der Folge auf andere Aspekte des Gesundheitszustandes der Bevölkerung eingegangen: Lebensstile, Inzidenz von Neoplasien, Verbreitung des Diabetes, Verbreitung der Kreislauf-, Atemweg- und Infektionskrankheiten sowie geistige Gesundheit.

2. ASPEKTE DER GESUNDHEIT

2.1. LEBENSSTILE

„Gesund leben“ ist der Fokus des vom Gesundheitsministerium in die Wege geleiteten Programms „Guadagnare salute“. Die Beseitigung der größten Risikofaktoren für chronisch-degenerative Krankheiten, nämlich ungesunde Ernährung, mangelhafte körperliche Bewegung, Rauchen und Alkoholmissbrauch wirkt sich positiv auf den Gesundheitszustand aus und gewährleistet gleichzeitig ein nachhaltiges Gesundheitssystem.

2.1.1. Ernährung

Indikatoren im Überblick

- Übergewichtige Personen in der Altersklasse von 18-69 Jahren (2007-08): 26,0%
- Fettleibige Personen in der Altersklasse von 18-69 Jahren (2007-08): 9,9%
- Übergewichtige Männer in der Altersklasse von 18-69 Jahren (2007-08): 46,5%
- Übergewichtige Frauen in der Altersklasse von 18-69 Jahren (2007-08): 24,8%
- Personen in der Altersklasse von 18-69 Jahren, die mindestens 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag zu sich nehmen (2007-08): 6,2%

Eine qualitativ und quantitativ ungesunde Ernährung gehört zu den größten Risikofaktoren für Pathologien wie arterielle Hypertonie, Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems, Übergewicht und Fettleibigkeit (auch im Zusammenhang mit mangelnder körperlicher Bewegung) und

Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes mellitus.

35,9% der Bevölkerung zwischen 18 und 69 Jahren sind übergewichtig (26,0% übergewichtig, 9,9% fettleibig). Übergewicht tritt häufiger unter den Männern (46,5%) als unter den Frauen (24,8%) und unter den Personen mit einem niedrigen Bildungsgrad (43,1%) als unter jenen mit höherem Studientitel (25,8%) auf.

2.1.2. Körperliche Bewegung

Indikatoren im Überblick

- Körperlich aktive Personen in der Altersklasse von 18-69 Jahren (2007-08): 50,4%
- Körperlich wenig aktive Personen in der Altersklasse von 18-69 Jahren (2007-08): 6,3%
- Personen ab 3 Jahren, die regelmäßig Sport betreiben (2007): 36,1%

Eine unzureichende körperliche Bewegung macht nicht nur anfälliger für Fettleibigkeit, sondern stellt auch einen Risikofaktor für verbreitete Krankheiten wie koronare Kardiopathie, Diabetes mellitus und einige Tumorarten dar.

50,4% der Bevölkerung zwischen 18 und 69 Jahren sind körperlich aktiv (berufsbedingt oder gemäß Empfehlungen zur körperlichen Betätigung), 6,3% betreiben überhaupt keinen Sport.

2.1.3. Rauchgewohnheit

Indikatoren im Überblick

- Raucher (Männer und Frauen) in der Altersklasse von 18-69 Jahren (2007-08): 34,1%
- Raucher (Männer und Frauen) in der Altersklasse von 18-24 Jahren (2007-08): 54,2%
- Raucher in der Altersklasse von 18-69 Jahren (2007-08): 34,8%
- Raucherinnen in der Altersklasse von 18-69 Jahren (2007-08): 23,6%
- Zigarettenkonsum pro Tag (2007): 12,7
- Tabakrauch-attributable Todesfälle (2006): 1.229,9

Rauchen ist „die häufigste, leicht vermeidbare Todesursache“. Rauchen ist für rund 28% der Todesfälle wegen Tumorerkrankungen und für 34% aller Todesfälle in Südtirol verantwortlich. Dem Tabakkonsum sind 75% der Tumoren der Mundhöhle, des Rachens und der Speiseröhre

und 80% der Lungentumoren zuzuschreiben. Außerdem führt Rauchen auch zu anderen Krankheiten wie Myokardinfarkt, Ischämie, chronisch-obstruktiver Bronchitis und sonstigen Störungen der Atemwege.

Die Rauchgewohnheit ist unter 34,1% der Landesbevölkerung zwischen 18 und 69 Jahren verbreitet (es rauchen 34,8% der Männern und 23,6% der Frauen). Jugendliche sind stärker davon betroffen: Im Alter zwischen 18 und 24 Jahren rauchen 54,2%.

2.1.4. Alkohol- und Drogenmissbrauch

Indikatoren im Überblick

- Von den DfA wegen Drogenmissbrauchs versorgte Patienten: 833
- Prävalenz der von den DfA wegen Drogenmissbrauchs versorgten Patienten in der Altersklasse von 15-54 Jahren: 3,1 pro 1.000 Einwohner
- Inzidenz der von den DfA wegen Drogenmissbrauchs versorgten Patienten in der Altersklasse von 15-54 Jahren: 3,5 pro 10.000 Einwohner
- Krankenhausentlassungen aufgrund von drogen-assoziierten Ursachen: 138
- Krankenhausentlassungsrate aufgrund von drogen-assoziierten Ursachen in der Altersklasse von 15-54 Jahren: 51,8 pro 100.000 Einwohner
- Von den DfA versorgte alkoholabhängige Patienten: 1.974
- Prävalenz der von den DfA versorgten alkoholabhängigen Patienten: 4,1 pro 1.000 Einwohner
- Krankenhausentlassungen aufgrund von alkohol-assoziierten Ursachen: 943
- Krankenhausentlassungsrate aufgrund von alkohol-assoziierten Ursachen: 1,9 pro 1.000 Einwohner
- Risikobehaftete Trinker in der Altersklasse von 18-69 Jahren (2007-08): 32,0%

Die Drogenabhängigkeit hat nicht nur direkte Auswirkungen auf die Gesundheit, sondern beeinträchtigt auch das soziale Verhalten des Einzelnen.

Im Jahr 2008 wurden von den Diensten für Abhängigkeitserkrankungen des Landes (DfA) 833 Personen mit Drogenproblemen versorgt, was einer Prävalenz von 3,1 Patienten pro 1.000 Einwohner im Alter zwischen 15 und 54 Jahren entspricht.

Nach den Schätzungen der WHO sind rund 9% der Gesamtausgaben für die Gesundheit in Europa auf den Missbrauch von alkoholischen Getränken zurückzuführen. Der Alkohol spielt bei der Erhöhung des Risikos für Erkrankungen wie Leberzirrhose, einigen Tumorarten, Hypertonie, Ischämie und angeborenen Missbildungen eine ausschlaggebende Rolle.

Die risikobehafteten Trinker („Binge Drinker“, Personen, die Alkohol außerhalb der Mahlzeiten konsumieren oder starke Trinker) stellen auf Landesebene 32,0% der Bevölkerung zwischen 18 und 69 Jahren dar; 24,4% davon trinken vorwiegend außerhalb der Mahlzeiten, 16,9% sind

„Binge Drinker“ (Konsum von 6 oder mehr alkoholischen Getränken zu einem einzigen Anlass im letzten Monat) und 12,4% sind starke Trinker (Konsum von mindestens 3 alkoholischen Getränken am Tag für die Männer und 2 für die Frauen).

2.2. MORBIDITÄT UND MORTALITÄT

Dieses Kapitel führt die unter der Bevölkerung am häufigsten verbreiteten Krankheiten an: Allgemeine chronische Krankheiten, Infektionskrankheiten, Tumoren, Diabetes, psychische Störungen, Krankheiten des Herzkreislaufsystems und Atemwegserkrankungen. Für die einzelnen Krankheiten werden die Daten zu Prävalenz, Inzidenz und Mortalität geliefert.

2.2.1. Verbreitung der chronischen Krankheiten

Indikatoren im Überblick

- Von mindestens einer chronischen Krankheit betroffene Bevölkerung: 25,8%
- Durchschnittsalter der chronisch Kranken: 61,9 Jahre
- Von mindestens einer chronischen Krankheit betroffene Senioren: 73,6%
- An Hypertonie leidende Bevölkerung: 14,3%
- Personen in der Stadt Bozen, die an einer Herzkreislauferkrankung leiden: Rund 21.000
- Von Hypothyreose betroffene Frauen: 5,9%
- Von einer Neoplasie betroffene Bevölkerung: 4,3%
- Von einer chronischen Atemwegserkrankung betroffene Männer: 3,6%

Die chronischen Krankheiten sind die häufigste Todesursache in fast aller Welt. Zu dieser weitumfassenden Gruppe zählen Kardiopathien, Neoplasien, Diabetes und chronische Atemwegserkrankungen. Sie sind nicht nur für eine hohe Sterblichkeitsrate verantwortlich, sondern wirken sich auch besonders invalidisierend aus, weshalb deren Bekämpfung für die öffentliche Gesundheit eine Priorität darstellt.

Die chronischen Krankheiten treten aus klinischer Sicht im fortgeschrittenen Alter auf; aus diesem Grund kann angenommen werden, dass ein Zusammenhang zwischen dem Durchschnittsalter der Bevölkerung und der Prävalenz der chronisch Kranken besteht. Die Südtiroler Wohnbevölkerung ist mit einem mittleren Alter von 40,8 Jahren und einem Altersindex von 112 Jahren (d. h. auf 100 Jugendliche kommen 112 Senioren) im Jahr 2008 relativ jung. Im Landesvergleich weist der Gesundheitsbezirk Bozen eine klar ältere Bevölkerungsstruktur als die Bezirke Brixen und Bruneck auf.

Im Jahr 2008 betrug der Anteil der Südtiroler mit mindestens einer chronischen Krankheit an der Gesamtbevölkerung 25,8% (jeder Vierte). Frauen sind etwas stärker gefährdet als die Männer, mindestens an einer chronischen Pathologie zu erkranken: Höhere Werte werden vor allem für Autoimmun- und endokrine Krankheiten wie die Hashimoto-Thyreoiditis und Hypothyreose verzeichnet.

14 Personen pro 100 Südtiroler leiden an Hypertonie; 4 pro 100 wurde eine Neoplasie diagnostiziert, 3 pro 100 der Diabetes, 4 pro 100 weisen ein Dyslipämie-Syndrom auf. Berücksichtigt man nur die ältere Bevölkerung (ab 65 Jahren), so leiden 70 Personen pro 100 an mindestens einer chronischen Krankheit.

Eine Analyse der standardisierten Raten nach territorialen Bereichen ergibt für ländliche Sprengel wie Leifers-Branzoll-Pfatten, das Passeiertal und das Wipptal Prävalenzschätzungen der chronischen Kranken, die jenen der städtischen Sprengel von Bozen und Meran sehr ähnlich sind. Die Prävalenz der einzelnen Krankheiten verläuft landesweit nicht immer homogen: Der Gesundheitsbezirk Bozen verzeichnet vor allem eine höhere Prävalenz von Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen und Hashimoto-Thyreoiditis. Im Gesundheitsbezirk Meran sind Dyslipämiekrankheiten stärker verbreitet. In den Gesundheitsbezirken Brixen und Bruneck, die allgemein niedrigere Raten aufweisen, liegt eine höhere Prävalenz von Krankheiten wie Parkinson (Brixen) und Psychosen (Bruneck) vor.

2.2.2. Infektionskrankheiten

Indikatoren im Überblick

- Gemeldete Infektionskrankheiten der Klasse II: 4.955
- Melderaten für Infektionskrankheiten der Klasse II: 1.107,7 pro 100.000 Einwohner
- Gemeldete Infektionskrankheiten der Klasse III: 56
- Melderaten für Infektionskrankheiten der Klasse III: 11,5 pro 100.000 Einwohner
- Krankenhausentlassungen aufgrund von Infektionskrankheiten: 2.124
- Krankenhausentlassungsrate aufgrund von Infektionskrankheiten: 436,2 pro 100.000 Einwohner
- Todesfälle aufgrund von Infektionskrankheiten (2006): 39
- Sterblichkeitsrate aufgrund von Infektionskrankheiten (2006): 8,1 pro 100.000 Einwohner
- Neue AIDS-Fälle: 4
- Prävalenzfälle von AIDS: 121
- Inzidenzrate von AIDS: 0,8 pro 100.000 Einwohner
- Prävalenzrate von AIDS: 24,9 pro 100.000 Einwohner

Die im Jahr 2008 am häufigsten gemeldeten Infektionskrankheiten waren die Kinderkrankheiten, darunter die Röteln mit 1.950 Fällen bei einer Inzidenz von 400,5 pro 100.000 Einwohner.

Außerdem wurden 2008 54 Tuberkulosefälle gemeldet (darunter 25 ausländische Bürger), was 11,1 pro 100.000 Einwohner entspricht (8,3 im Jahr 2007).

Zwischen 1982, als AIDS in Italien zum ersten Mal diagnostiziert wurde, und 2008 wurden unter den Südtirolern 266 Fälle von AIDS gemeldet. Die Inzidenz der neuen AIDS-Fälle betrug für das Jahr 2008 4 (0,8 pro 100.000 Einwohner). In Italien wurden im Jahr 2008 977 neue Fälle gemeldet, gleich einer Inzidenz von 1,6 Fällen pro 100.000 Einwohner. Die Melderate der neuen HIV-Infektionen belief sich auf Landesebene im Jahr 2007 auf 8,2 pro 100.000 Einwohner (4,7 im Jahr 2006).

2.2.3. Bösartige Tumoren

Indikatoren im Überblick

- Neue erwartete Fälle von bösartigen Tumoren - Männer (2008): 1.635
- Neue erwartete Fälle von bösartigen Tumoren - Frauen (2008): 1.122
- Jährliche Inzidenzrate der bösartigen Tumoren - Männer (2001-2005): 620,1 pro 100.000 Männer
- Jährliche Inzidenzrate der bösartigen Tumoren - Frauen (2001-2005): 465,7 pro 100.000 Frauen
- Erwartete Todesfälle aufgrund von bösartigen Tumoren - Männer (2008): 619
- Jährliche Sterblichkeitsrate aufgrund von bösartigen Tumoren - Männer (2001-2005): 265,4 pro 100.000 Männer
- Erwartete Todesfälle aufgrund von bösartigen Tumoren - Frauen (2008): 503
- Jährliche Sterblichkeitsrate aufgrund von bösartigen Tumoren - Frauen (2001-2005): 210,0 pro 100.000 Frauen

Die Inzidenzschätzungen der in der Südtiroler Wohnbevölkerung diagnostizierten bösartigen Tumoren beziehen sich auf den Fünfjahreszeitraum 2001-2005 (Teildaten zum Stand 31.06.2009).

Für den besagten Zeitraum wurden im Jahresdurchschnitt 1.446 neue Fälle unter den Männern und 1.114 unter den Frauen diagnostiziert. Hauttumoren ausgeschlossen (ICD X: C44) sind für das Jahr 2008 1.557 neue Fälle unter den Männern (591,8 pro 100.000 Männer) und 1.158 neue Fälle unter den Frauen (442,3 pro 100.000 Frauen) zu erwarten. Die unter den Kindern (0-14 Jahre) beobachteten Tumorfälle betrugen im Jahresdurchschnitt 26 für die Jungen und 21

für die Mädchen.

Schließt man die Hautkarzinome aus (ICD X C44), betreffen die am häufigsten, bei den Männern auftretenden Tumoren die Lokalisationen Prostata (25,8% der Fälle), Kolon-Rektum (12,6%), Lunge (9,8%), Blase (9,7%) und Magen (5,6%).

Bei den Frauen tritt das Mammakarzinom (27,4% der Fälle) an erster Stelle unter den Neoplasien auf, gefolgt vom Kolon- und Rektumkarzinom (12,5%), Magenkarzinom (5,6%), von den Melanomen (5,4%) und vom Lungenkarzinom (5,2%).

Im Zeitraum 2001-2005 verstarben pro Jahr durchschnittlich 619 Männer an Tumorerkrankungen (265,4 Todesfälle pro 100.000 Einwohner) und 503 Frauen (210 Todesfälle pro 100.000). Für das Jahr 2008 können somit für Südtirol insgesamt 1.287 Todesfälle aufgrund von Tumoren geschätzt werden, davon 722 unter den Männern und 565 unter den Frauen.

Unter den Männern sind die häufigsten Todesursachen aufgrund von Neoplasien das Lungenkarzinom (20,2% der Fälle), das Kolon-Rektum-Karzinom (12,0%), das Prostatakarzinom (11,0%), das Magenkarzinom (8,2%) und das Leberkarzinom (6,3%). Bei den Frauen ist das Mammakarzinom für die meisten Todesfälle verantwortlich (16,7%), gefolgt vom Kolon-Rektum-Karzinom (11,9%), vom Lungenkarzinom (9,1%), vom Magenkarzinom (8,4%) und vom Pankreaskarzinom (8,2%).

Für die Vergleichsdaten der anderen Regionen Italiens wird auf die Homepage der Italienischen Vereinigung der Tumorregister verwiesen: <http://www.registri-tumori.it/cms/>.

2.2.4. Diabetes

Indikatoren im Überblick

- Prävalenz der diabetischen Patienten an der gesamten Wohnbevölkerung: 3,5%
- Durchschnittsalter: 67,7 Jahre
- Drei Viertel der Diabetiker leiden an einer Herz-Kreislaufkrankheit, zwei Drittel sind Hypertonie-Patienten
- Rund 70% der Diabetiker lassen im Jahr mindestens eine Kreatinin- und Hämoglobin-Untersuchung durchführen
- Diabetiker, die mindestens ein Medikament für Diabetes eingenommen haben (orales Antidiabetikum, Aggregationshemmer, Lipidsenker oder Insulin): 84,2%
- Hospitalisierungsrate wegen Diabetes: 132,1 Aufenthalte von Ansässigen pro 100.000 Einwohner

Diabetes mellitus ist mit seinen Komplikationen eines der größten Gesundheitsprobleme der

Industrieländer; seine Prävalenz steigt - auch aufgrund der sich stärker verbreitenden Fettleibigkeit und des zunehmenden Bewegungsmangels - ständig an. Die Fachliteratur schätzt die Prävalenz auf rund 4,6% der allgemeinen Bevölkerung (ISTAT, 2007), wobei jedoch weitere 3% mit nicht diagnostiziertem Diabetes anzunehmen sind.

Der Diabetes mellitus tritt in zwei Hauptformen auf:

- Diabetes Typ 1 (8% der Fälle) ist eine vorwiegend in der Kindheit und Jugend vorkommende Form, die mit Insulin behandelt werden muss;
- Diabetes Typ 2 (über 90% der Fälle) bricht allgemein im Erwachsenenalter oder Greisenalter aus und kann oft durch Diät, körperliche Bewegung und/oder orale Hypoglykämika unter Kontrolle gehalten werden.

Im Jahr 2008 wurden in Südtirol 17.523 diabetische Patienten betreut (17.109 in durchlebten Jahren), bei einer Prävalenz an der gesamten betreuungsberechtigten Bevölkerung von 3,5%.

Die Prävalenz der Kranken steigt mit zunehmendem Alter an und erreicht Werte von 11,1% zwischen 65 und 74 Jahren und 13,8% ab 75 Jahren. Das Durchschnittsalter der diabetischen Bevölkerung liegt bei 67,7 Jahren.

Der Prozentsatz der Männer (52,1%) übersteigt jenen der Frauen leicht, ist aber vor allem in der Altersklasse zwischen 45 und 74 Jahren höher.

Die Prävalenz der Krankheit verläuft auf Landesebene wenig homogen. Die großen Bevölkerungszentren verzeichnen standardisierte Prävalenzraten über dem Landesdurchschnitt, was auf eine höhere Inanspruchnahme des Landesgesundheitsystems seitens der dort ansässigen Diabetiker zurückzuführen ist.

Drei Viertel der Diabetiker auf Landesebene leiden auch an einer Herz-Kreislaufkrankheit, zwei Drittel sind Hypertonie-Patienten, 6,6% sind von einer Neuropathie betroffen und 4,8% leiden an einer schweren Herzinsuffizienz.

Rund 70,9% der Südtiroler Diabetiker lassen im Jahr mindestens eine Kreatinin-Untersuchung, 69,5% eine Glykohämoglobin-Untersuchung durchführen (der gesamtstaatliche Vergleichswert, der in den Nationalen AMD-Leitlinien (AMD - Verband italienischer Diabetesärzte) für das Glykohämoglobin angeführt ist, beträgt 84% gegenüber einem angestrebten Zielwert von 100%). Hinsichtlich der Pharmakotherapie nahmen im Jahr 2008 64,9% der diabetischen Patienten mindestens ein orales Antidiabetikum ein, 36,2% mindestens einen Aggregationshemmer, 36,2% einen Lipidsenker und 17,3% führten die Behandlung mit Insulin durch. Die pharmakologische Behandlung des Diabetes erfolgt in den meisten Fällen in Kombination mehrerer Medikamente: 84,2% der Diabetiker nahmen im Laufe des Jahres mindestens eines dieser Medikamente ein.

Die Hospitalisierungsrate wegen Diabetes beträgt in Südtirol 132,1 Aufenthalte pro 100.000 Einwohner (ausgeschlossen die Aufenthalte in italienischen Einrichtungen außerhalb des Landes und in österreichischen Einrichtungen). Berücksichtigt man nur die Bevölkerung über 18

Jahren, steigt die Rate auf 138,4 Aufenthalte pro 100.000 Einwohner.

Die Hospitalisierungsrate wegen Diabetes mit langzeitigen Komplikationen (in Bezug auf Nieren, Augen und Nerven, das periphere Kreislaufsystem oder andere spezifizierte und nicht spezifizierte Komplikationen) beträgt 65,8 Aufenthalte pro 100.000 Einwohner über 18 Jahren.

2.2.5. Psychische Störungen

Indikatoren im Überblick

- Von den Zentren für Geistige Gesundheit betreute Patienten: 9.197
- Prävalenz der von den Zentren für Geistige Gesundheit betreuten Patienten: 18,9 pro 1.000 Einwohner
- Krankenhausentlassungen aufgrund von psychischer Krankheit: 3.163
- Krankenhausentlassungsrate aufgrund von psychischer Krankheit: 649,6 pro 100.000 Einwohner
- Von den Psychologischen Diensten betreute Patienten: 7.172
- Vom Dienst für Verkehrspsychologie betreute Patienten: 1.585
- Prävalenz der von den Psychologischen Diensten betreuten Patienten: 14,7 pro 1.000 Einwohner
- Suizidfälle: 51
- Suizidrate: 10,5 pro 100.000 Einwohner

Der Psychiatrische Dienst ist eine komplexe Struktur, die durch die technische und verwaltungstechnische Koordinierung der operativen Einrichtungen einen integrierten Betrieb, die therapeutische Kontinuität sowie eine einheitliche Planung und Umsetzung der Therapie- und sozialen Wiedereingliederungspläne garantiert. Die gesundheitlichen Einrichtungen des Psychiatrischen Dienstes sind das Zentrum für Geistige Gesundheit (ZGG), der Psychiatrische Dienst für Diagnose und Behandlung, das Day-and-Night Hospital, die Rehabilitationszentren und weitere Einrichtungen für die stationäre und halbstationäre Versorgung.

Im Jahr 2008 wurden von den Zentren für Geistige Gesundheit des Landes 9.197 Personen betreut (18,9 pro 1.000 Einwohner), 3.163 Patienten wurden mit psychiatrischer Primärdiagnose aus dem Krankenhaus entlassen (649,6 pro 100.000 Einwohner). Unter den Entlassungsdiagnosen überwiegen die affektiven Psychosen (29,0% der Entlassungen).

Die Psychologischen Dienste betreuten im Jahr 2008 7.172 Patienten (14,7 pro 1.000 Einwohner). Die Zahl der Nutzer des Dienstes für Verkehrspsychologie betrug hingegen 1.585. 2008 gab es im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt 2004-2008 von 47,8 Fällen 51 Suizide (10,5 pro 100.000 Einwohner).

2.2.6. Krankheiten des Kreislaufsystems

Indikatoren im Überblick

- Prävalenz der chronischen Vaskulopathie - Männer: 154,1 pro 1.000 Männer
- Prävalenz der chronischen Vaskulopathie - Frauen: 173,4 pro 1.000 Frauen
- Prävalenz der Hypertonie - Männer: 132,0 pro 1.000 Männer
- Prävalenz der Hypertonie - Frauen: 153,0 pro 1.000 Frauen
- Todesfälle aufgrund von Krankheiten des Kreislaufsystems - Männer (2006): 563
- Todesfälle aufgrund von Krankheiten des Kreislaufsystems - Frauen (2006): 818
- Sterblichkeitsrate aufgrund von Krankheiten des Kreislaufsystems - Männer (2006): 239,1 pro 100.000 Männer
- Sterblichkeitsrate aufgrund von Krankheiten des Kreislaufsystems - Frauen (2006): 336,0 pro 100.000 Frauen
- Krankenhausentlassungen aufgrund von Krankheiten des Kreislaufsystems - Männer: 4.961
- Krankenhausentlassungen aufgrund von Krankheiten des Kreislaufsystems - Frauen: 4.221
- Hospitalisierungsrate aufgrund von Krankheiten des Kreislaufsystems - Männer: 2.073,9 pro 100.000 Männer
- Hospitalisierungsrate aufgrund von Krankheiten des Kreislaufsystems - Frauen: 1.704,3 pro 100.000 Frauen

Die Krankheiten des Herzkreislaufsystems stellen die erste Todesursache in den entwickelten Ländern dar und sind für 39,0% der Todesfälle in Südtirol verantwortlich. Die größten Risikofaktoren für die Krankheiten des Herzkreislaufsystems sind die Hypertonie, die Hypercholesterinämie, der Diabetes und die Fettleibigkeit.

Für eine an Hypertonie leidende Person ist das Risiko, an einer koronaren Herzkrankheit zu sterben, zwei- bis viermal höher als für eine nicht an Hypertonie leidende Person, und um über viermal höher, an einer Ischämie zu sterben. Schätzungen zufolge sind 25% der Todesfälle aufgrund von koronaren Herzkrankheiten oder Ischämie Hypertonie-assoziiert. Die an Hypercholesterinämie Leidenden verzeichnen ein zweimal so hohes Todesrisiko aufgrund von ischämischen Herzleiden und Ischämie im Vergleich zu den Personen mit normaler Cholesterinämie. Für das Jahr 2008 wird in der Wohnbevölkerung eine Prävalenz von 163,9 Fällen pro 1.000 chronische Herzkreislaufkranke (154,1 pro 1.000 unter den Männern und 173,4 pro 1.000 unter den Frauen) und von 142,7 Fällen pro 1.000 Hypertonie-Patienten geschätzt (132,0 unter den Männern und 153,0 unter den Frauen). Insgesamt belief sich die Zahl der Krankenhausentlassungen aufgrund von Herzkreislaufkrankungen auf 9.182

(1.885,8 pro 100.000 Einwohner). Unter den Entlassungen aufgrund von ischämischen Krankheiten (1.039) gehen 654 auf akuten Myokardinfarkt zurück (389 Männer und 265 Frauen). Im Vorjahresvergleich sind die Entlassungen wegen Infarkt unter den Männern um 4 Fälle rückläufig, während es unter den Frauen 30 Entlassungen mehr gab. Die häufigsten Todesursachen bei Krankheiten des Kreislaufsystems waren im Jahr 2006 die ischämischen Herzleiden (Infarkt, Angina pectoris und ischämische Herzerkrankungen) mit 259 Todesfällen unter den Männern (110,0 pro 100.000) und 280 unter den Frauen (115,0 pro 100.000).

2.2.7. Atemwegserkrankungen

Indikatoren im Überblick

- Prävalenz der chronischen Bronchopathien - Männer: 36,5 pro 1.000 Männer
- Prävalenz der chronischen Bronchopathien - Frauen: 29,5 pro 1.000 Frauen
- Todesfälle aufgrund von Atemwegserkrankungen - Männer (2006): 153
- Todesfälle aufgrund von Atemwegserkrankungen - Frauen (2006): 108
- Sterblichkeitsrate aufgrund von Atemwegserkrankungen - Männer (2006): 65,0 pro 100.000 Männer
- Sterblichkeitsrate aufgrund von Atemwegserkrankungen - Frauen (2006): 44,4 pro 100.000 Frauen
- Krankenhausentlassungen aufgrund von Atemwegserkrankungen - Männer: 3.186
- Krankenhausentlassungen aufgrund von Atemwegserkrankungen - Frauen: 2.351
- Hospitalisierungsrate aufgrund von Atemwegserkrankungen - Männer: 1.331,9 pro 100.000 Männer
- Hospitalisierungsrate aufgrund von Atemwegserkrankungen - Frauen: 949,2 pro 100.000 Frauen

Die Atemwegserkrankungen sind nach den Krankheiten des Kreislaufsystems und den Tumoren in Südtirol die dritthäufigste Todesursache (7,5%).

Die chronisch-obstruktive Bronchopneumopathie (COBP) ist für über die Hälfte der Todesfälle aufgrund von Lungenkrankheiten verantwortlich und ständig im Anstieg.

Rauchen ist der bedeutendste Umweltfaktor für die Entwicklung der chronischen Bronchitis und COBP: 15-20% der Raucher leiden an einer klinisch relevanten Bronchialobstruktion, ein geringerer Anteil an einer invalidisierenden Atmungsinsuffizienz. Die für das Jahr 2008 geschätzte Prävalenz der chronischen Bronchopathien entspricht in Südtirol 32,9 Fällen pro

1.000 Einwohner (36,5 unter den Männern und 29,5 unter den Frauen).

Die Entlassungen aus Landeseinrichtungen mit einer Atemwegserkrankung als Primärdiagnose beliefen sich im Jahr 2008 insgesamt auf 5.537, wobei die Hospitalisierungsrate 1.137,2 pro 100.000 betrug. Die häufigsten Aufenthaltsdiagnosen waren Pneumonie und Grippe.

Die Pneumonie und Grippe stellten im Jahr 2006 unter den Atemwegserkrankungen die häufigste Todesursache (27,2 pro 100.000 für die Männer und 20,5 pro 100.000 für die Frauen).

2.2.8. Sterblichkeit nach Ursachen

Indikatoren im Überblick

- Sterblichkeitsrate (Todesfälle mit kodierter Ursache) - Männer (2006): 735,4 pro 100.000 Männer
- Sterblichkeitsrate (Todesfälle mit kodierter Ursache) - Frauen (2006): 747,1 pro 100.000 Frauen

Die Bezugsquelle für die Daten zur Sterblichkeit ist das Landessterblichkeitsregister, das die Informationen der ISTAT-Totenscheine verwaltet und bearbeitet und der Haupttodesursache den entsprechenden Kodex zuweist. Die Kodierung ist bis zum Jahr 2006 fast vollständig, für die nach diesem Datum erfolgten Todesfälle jedoch nicht verfügbar.

Die in der Wohnbevölkerung im Jahr 2006 verzeichneten Todesfälle beliefen sich auf 3.632, was einer unbereinigten Sterblichkeitsrate von 7,6 pro 1.000 entspricht.

Die Haupttodesursache waren 2006 die Krankheiten des Kreislaufsystems; diese betrafen 45,1% der Fälle in der weiblichen Bevölkerung und 32,7% in der männlichen Bevölkerung. Unter der Männern herrscht die Sterblichkeit aufgrund von Tumoren mit 37,2% gegenüber den 28,4% unter den Frauen sowie aufgrund von Traumata und Vergiftungen (6,2% vs. 2,9%) vor.