Tabelle 2.2.25 - Zugänge zu den Erste-Hilfe aufgrund von psychiatrischen Krankheiten nach Geschlecht und Diagnose. Südtirol - Jahr 2020

		Zugänge			Raten pro 100.000		
ICD IX		**Männer**	**Frauen**	**Insgesamt**	**Männer**	**Frauen**	**Insgesamt**
290	Stati psicotici organici senili e presenili	47	87	134	17,8	32,3	25,2
291	Psicosi alcoliche	90	30	120	34,1	11,1	22,5
292	Psicosi da farmaci	36	10	46	13,6	3,7	8,6
293	Stati psic. organici transitori	77	136	213	29,1	50,5	40
294	Altri stati psicotici organici	4	8	12	1,5	3,0	2,3
295	Psicosi schizofreniche	25	29	54	9,5	10,8	10,1
296	Psicosi affettive	124	163	287	46,9	60,5	53,9
297	Stati paranoidi	10	15	25	3,8	5,6	4,7
298	Altre psicosi non organiche	71	61	132	26,9	22,6	24,8
299	Psicosi con origine specifica nell'infanzia	4	-	4	1,5	-	0,8
300	Disturbi neurotici	283	451	734	107,1	167,4	137,8
301	Disturbi della personalità	32	45	77	12,1	16,7	14,5
303	Sindrome di dipendenza alcol	184	84	268	69,6	31,2	50,3
304	Farmacodipendenza	17	3	20	6,4	1,1	3,8
305	Abuso di droghe senza dipendenza	182	44	226	68,9	16,3	42,4
306	Disfunzioni somatiche	40	54	94	15,1	20,0	17,6
307	Sintomi o sindromi speciali	248	365	613	93,8	135,5	115,1
308	Reazione acuta a situazioni stressanti	62	60	122	23,5	22,3	22,9
309	Reazione di adattamento	101	155	256	38,2	57,5	48,1
310	Disturbi psichici specifici	18	18	36	6,8	6,7	6,8
311	Disturbi depressivi non classificati	3	7	10	1,1	2,6	1,9
312	Disturbi della condotta	13	11	24	4,9	4,1	4,5
313	Disturbi dell'emotività	29	28	57	11	10,4	10,7
314	Sindrome ipercinetica infanzia	10	2	12	3,8	0,7	2,3
315	Ritardi specifici dello sviluppo	6	4	10	2,3	1,5	1,9
317	Oligofrenia lieve	1	1	2	0,4	0,4	0,4
318	Altre oligofrenie specificate	-	-	-	-	-	-
319	Oligofrenia non specificata	1	1	2	0,4	0,4	0,4
	Totale	**1718**	**1872**	**3590**	**650,0**	**694,8**	**674,0**

Quelle: Südtiroler Sanitätsbetrieb - SPS