

OEGDS

45.13_0 **ÖSOPHAGO-GASTRO-DUODENOSKOPIE [ÖGD]**

45.16.1_0 **ÖSOPHAGO-GASTRO-DUODENOSKOPIE [ÖGD] MIT BIOPSIE (EINE ENTNAHMESTELLE). Nicht vereinbar mit: Ösophagusbiopsie (42.24 und 42.24.1); Magenbiopsie (44.14); Duodenumbiopsie (45.14.1)**

45.16.2_0 **ÖSOPHAGO-GASTRO-DUODENOSKOPIE [ÖGD] MIT BIOPSIE (MEHRERE ENTNAHMESTELLEN). Nicht vereinbar mit: Ösophagusbiopsie (42.24 und 42.24.1); Magenbiopsie (44.14); Duodenumbiopsie (45.14.1)**

42.24_0 **ÖSOPHAGO-GASTRO-DUODENOSKOPIE [ÖGD] MIT BIOPSIE DES ÖSOPHAGUS**

Art der Visite	Maximale Wartezeit	Diagnostische Leitlinien
Dringend [U]	Erste Hilfe/innerhalb 24 h	Akute gastrointestinale Blutung (Hämatemesis, Meläna, massive Darmblutung)
		Ätzende Einnahme
		Fremdkörper
Breve [B]	Innerhalb von 10 Tagen	Syntomatische Eisenmangelanämie mit Hb < 10
		Allarmsymptome: Persistierendes und starkes Erbrechen, Dysphagie, Odynophagie, Gewichtsverlust mit Symptomen aus dem Verdauungstrakt
		Ausschluß von Läsionen zur Durchführung von dringenden Behandlungen oder chirurgischen Eingriffen
		Radiologischer und klinischer V.a. Neoplasien
Aufschiebbar [D]	Innerhalb von 60 Tagen	Abdominelle Raumforderungen
		Chronische Eisenmangelanämie
		Dyspepsie bei > 45 Jahre altem Patient
		Gastroösophagale Refluxkrankheit in Patienten > 45 Jahre (bisher keine OEGDS) oder therapieresistent
	Leistung die über einen größeren Zeitraum geplant werden kann,	Biopsie bei V.a. Zöliakie/Malabsorption

Art der Visite	Maximale Wartezeit	Diagnostische Leitlinien
Programmiert [P]	da diese auf Prognose, Schmerzen, Dysfunktion oder Behinderung keinen Einfluss hat. Auf jeden Fall ist die Leistung innerhalb von 120 Tagen zu erbringen.	Dyspeptisches Schmerzsyndrom in Patienten < 45 Jahre (bisher keine OEGDS) , mit persistierender Symptomatologie auch nach Antherapierung