

Tel. 0474 581370 Fax 0474 581370 labbk@sabes.it

Ricerca di parassiti nelle feci: raccolta informazioni e istruzioni per il prelievo

Cognome	Nome	Data di nascita	Paese di nascita
Medico richiedente (nome e telefono)	Numero di campioni prescritti: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ Ha già eseguito la ricerca di parassiti precedentemente? ☐ sì ☐ no Ha mangiato carne cruda/poco cotta? ☐ sì ☐ no Quando? _____ Ha mangiato pesce crudo/poco cotto? ☐ sì ☐ no Quando? _____		
Motivo dell'esame: ☐ Rientro da un Paese straniero (quale?): _____ Data di rientro: _____ ☐ Contatto con acque dolci in Paese straniero (quale?): _____ ☐ Controllo dopo trattamento di un parassita (quale?): _____ ☐ Un familiare/convivente/comagno è affetto da: _____ ☐ Contatti con animali (quale?): _____ Lavoro in ambiente rurale: ☐ sì ☐ no ☐ Eosinofilia ☐ Immunodepressione ☐ Terapie con cortisonici ☐ Altro (specificare): _____ Altre terapie: _____			
Sintomi: ☐ Febbre ☐ Tosse ☐ Diarrea ☐ Dimagrimento ☐ Dolori addominali ☐ Vomito ☐ Nausea/Inappetenza ☐ Prurito anale ☐ Prurito cutaneo ☐ Rush/esantema ☐ Altro (specificare): _____		Note:	
Esame coproparassitologico standard: ricerca dei più frequenti protozoi ed elminti causa di parassitosi intestinali (eccetto ossiuri, <i>Strongyloides s.p.</i> e coccidi) Codice mnemonico interno per accettazione: PARS Prestazione amministrativa: 91.05.4		ISTRUZIONI PER IL PRELIEVO Richiedere al Centro di prelievo 3 contenitori per la raccolta delle feci (Sono forniti con questa scheda). 2-3 giorni prima del prelievo: Non usare lassativi, antidiarroeici, antimicrobici, o altre sostanze interferenti come antiacidi, bario, bismuto, oli minerali. Nella dieta evitare: legumi, frutta secca, frutta e verdure a cuticola resistente (pesche, albicocche, pomodori, pere), fragole, fichi, carote, banane. Per il prelievo: Raccogliere le feci in un contenitore pulito, non necessariamente sterile. Non contaminare con le urine o con l'acqua del water. Prelevare con il cucchiaino fornito sul tappo in più punti, specie dalle zone dove sono eventualmente presenti sangue o muco, una quantità di feci pari ad una noce o metà contenitore Richiudere il flacone riavvitando il tappo: <u>assicurarsi che sia ben chiuso.</u> Lavarsi bene le mani con acqua e sapone. Indicare sull'etichetta del contenitore il nome del paziente e la data di raccolta Ripetere il prelievo, utilizzando due nuovi contenitori, in giorni non consecutivi. Conservare a 2-8 °C e consegnare ciascun campione entro 24 ore al centro prelievo	
Sistema di raccolta/contenitore: Provetta tappo marrone o analogo contenitore apposito per coprocultura 		Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore: - Pazienti esterni: Centri prelievo del distretto sanitario di Brunico - Reparti e ambulatori ospedalieri: Magazzino Dove consegnare dopo la raccolta: in qualsiasi Centri prelievo del distretto sanitario di Brunico. Per orari di apertura si veda sito https://www.asdaa.it/it/centriprelievi.asp Quando: consegnare la scheda compilata assieme al primo campione, gli altri nei giorni successivi (conservare l'impegnativa)	
NOTE: In caso sia visibile un verme o sospetto tale, metterlo in un contenitore senza feci e segnalarlo sulla scheda. In caso persistenza di sintomi con feci liquide, esame parassitologico negativo, ma comunque sospetto di parassitosi, si consiglia di richiedere lo screening molecolare per protozoi intestinali.			