

Parasiten-Nachweis im Stuhl: Informationsblatt

Das genaue Ausfüllen des Anamnesebogens garantiert **EIN OPTIMALES ERGEBNIS** dieser Anfrage

Nachname	Vorname	Geburtsdatum
Geburtsland	Telefonnummer des Patienten	
Arzt/Einsender	Telefonnummer Arzt/Einsender	

Haben Sie Parasiten-Nachweis schon durchgeführt? ☐ nein ☐ ja Wann? _____
Ergebnis _____

MOTIV DER UNTERSUCHUNG

- ☐ Aufenthalt in außer-europäischen Ländern:
Land _____ **letztes Datum der Rückkehr!** _____
- ☐ Kontakt mit Wasser in außer-europäischen Ländern:
Land _____ **letztes Datum der Rückkehr!** _____
- ☐ Kontrolle nach antiparasitärer Therapie:
Parasit: _____ Medikament: _____ **Ende der Therapie am:** _____
- ☐ Hat ein Familienmitglied Parasiten? ☐ Nein ☐ JA Welchen Parasiten? _____
- ☐ Kontakt mit Tieren? ☐ NEIN ☐ JA Welche? _____
- ☐ Arbeit/Wohnen in ländlicher Gegend ☐ JA ☐ NEIN
- ☐ **Weiteres (bitte mitteilen)** _____

KLINISCHE DATEN/LABORANALYSEN

- ☐ Eosinophilie (%) _____ ☐ Anämie ☐ Immunschwäche ☐ Kortison-Therapie
- ☐ Anderes (**Bitte angeben**) _____

SYMPTOME ☐ NEIN ☐ JA SEIT WANN: _____


- ☐ Gelegentlich Durchfall ☐ Ständiger Durchfall ☐ Übelkeit/Appetitlosigkeit ☐ Bauchschmerzen ☐ Erbrechen
- ☐ Unregelmäßiger Stuhlgang ☐ Gewichtsverlust/Wachstumsdefizit ☐ Husten ☐ Fieber ☐ Hautausschlag
- ☐ Hautjuckreiz ☐ Analer Juckreiz ☐ Anderes (angeben) _____

AUSSEHEN DES STUHL

- I Probe: ☐ fest ☐ halbflüssig ☐ flüssig ☐ wässrig ☐ blutig
- II Probe: ☐ fest ☐ halbflüssig ☐ flüssig ☐ wässrig ☐ blutig
- III Probe: ☐ fest ☐ halbflüssig ☐ flüssig ☐ wässrig ☐ blutig

VERDACHT AUF WÜRMER IM STUHL ☐ nein ☐ ja Farbe _____ Länge: cm _____

EVENTUELLE ANMERKUNGEN



Parasitologische


Standarduntersuchung des Stuhls:

Nachweis von Protozoen und Helminthen (außer Oxyuren, Anisakis sp., Strongyloides sp. und Coccidien, z.B. Cysto -Isospora belli). Für den Nachweis von Coccidien eigene Anforderung stellen.


SAMMELSYSTEM:

Das Kit besteht aus 3 Behältern und einem vorne und rückseitig beschriebenen Anamneseblatt in einer Hülle, welche dem Patienten/ der Patientin ausgehändigt wird.

• **Midi Parasep SF – Drei Behälter**



• **Informationsblatt**



Wo bekommt man das Probensammel-Kit:

- Externe Patienten: Abnahmezentren – Südtiroler Sanitätsbetrieb
- Krankenhaus-Abteilungen oder Ambulatorien: Magazin-Kodex 5158849

Wo abgeben nach Probensammlung:

Ist die Probe NICHT mit Blutproben kombiniert, kann diese nur im LMV-BZ (Labor für Mikrobiologie und Virologie) oder im LPC-BZ (Zentrallabor für klinische Pathologie des Krankenhaus Bozen) in den, laut Homepage [Labore | Gesundheitsbetrieb \(sabes.it\)](http://Labore.Gesundheitsbetrieb.sabes.it) vorgegebenen Zeiten, abgegeben werden. Eine Vormerkung ist NICHT nötig!

Wann:

ALLE DREI PROBEN **GEMEINSAM - NICHT EINZELN - UND ZUSAMMEN MIT DEM AUSGEFÜLLTEN FORMULAR** ABGEBEN, SOBALD DIE PROBENSAMMLUNG ABGESCHLOSSEN IST.

ANWEISUNGEN FÜR DIE PROBENENTNAHME

SAMMLUNG DER STUHLPROBE

Drei Tage vor der Probensammlung:

♦ Verwenden Sie keine Abführmittel, Durchfallblocker, Aktivkohle, oder Säureblocker. Wenn unbedingt erforderlich, können Sie Glyzerinzäpfchen verwenden, um den Stuhlgang zu fördern. Dieses nicht im Sammelbehälter auffangen!

- ♦ Vermeiden Sie das Verzehren von Birnen, Bananen oder Trockenobst, da diese die Untersuchung erschweren.
- ♦ Vermeiden Sie gleichzeitige Antibiotikatherapien. Sollten Sie in Antibiotika-Therapie sein, ist es sinnvoll, die Probensammlung ca. 20 Tage nach Beendigung der Therapie durchzuführen, außer es liegt eine dringende Indikation vor.

Probensammlung **DREI STUHLPROBEN MÜSSEN AN NICHT AUF EINANDERFOLGENDEN TAGEN GESAMMELT WERDEN**

♦ Den Stuhl in einem sauberen, nicht unbedingt sterilem Behälter sammeln, ohne Harn oder Klowasser mitaufzufangen.



♦ **Die Flüssigkeit im Behälter ist giftig und möglicherweise krebserregend. Sie darf weder inhaliert noch getrunken werden, und auch nicht in Kontakt mit Haut und Augen kommen.**

(VORSICHT AUF HAUT UND AUGEN!). Den Behälter durch vorsichtiges Drehen des Deckels öffnen. HANDSCHUHE BENÜTZEN UND AUGEN SCHÜTZEN. Bei erfolgreichem Einatmen: an die frische Luft gehen. Bei Hautkontakt: mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser und mit Seife waschen. Bei Kontakt mit den Augen: mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser auswaschen. Bei Verschlucken: nicht Erbrechen erzwingen, nichts Essen und Trinken. – Wenden Sie sich sofort an die ERSTE HILFE oder an eine GIFTNOTRUFZENTRALE.

♦ Mit dem auf dem Deckel beigelegten Löffelchen an verschiedenen Stellen, vor allem dort wo möglicherweise Blut oder Schleim vorhanden ist, so viel Stuhlprobe entnehmen, dass das Löffelchen gestrichen voll ist, wenn der Stuhl fest ist. Bei flüssigem Stuhl 2 gestrichene Löffel voll entnehmen.

♦ Den Behälter wieder gut verschließen, um ein Austreten der Probe zu vermeiden.

♦ Fest schütteln um die Stuhlprobe mit der Flüssigkeit im Behälter gut zu vermischen.

♦ Mit Wasser und Seife Hände gut waschen.

Die Abnahme noch 2x an nicht aufeinanderfolgenden Tagen wiederholen.

VORHANDENSEIN EINES MÖGLICHEN WURMS

Finden Sie eine wurmförmliche Struktur, geben Sie diese in einen leeren Behälter ohne Stuhl und teilen Sie es uns mit, indem Sie es auf das Anamneseblatt und AUCH DEUTLICH AUF DEN BEHÄLTER SCHREIBEN: WURMVERDACHT

AUFBEWAHRUNG DER STUHLPROBEN Die gefüllten Behälter werden bei Raumtemperatur, vor Kindern sicher, aufbewahrt.

