

Istruzioni per il prelievo del campione

Analisi: screening molecolare apparato genitourinario (urina)

Ricerche (codice mnemonico d'accettazione)

- Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum (**1PMST**)

Sistema di raccolta/contenitore

- Vasetto sterile per raccolta urine (**tappo giallo**)
- provetta 9 ml senza conservanti (**tappo bianco**-come per esame chimico fisico dell'urina)



Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore

- Pazienti esterni: Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
- Reparti e ambulatori ospedalieri (codici magazzino):

tappo giallo – 5060007

tappo bianco – 5024693

Dove consegnare dopo la raccolta: in qualsiasi Centro prelievo dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Per gli orari d'apertura si veda sito <https://www.asdaa.it/it/distretti-sanitari.asp>.

Quando: il prima possibile; nel caso si rendesse necessario, il campione può essere conservato in frigorifero per non più di 72 ore (non congelare!).

- Non urinare almeno nelle due ore antecedenti la raccolta del campione.**

- Raccogliere il primo mitto d'urina nel vasetto tondo (tappo giallo), dopo accurata igiene, senza toccare l'interno del contenitore.



- Chiudere bene il contenitore.
- Capovolgere la provetta da 9 ml (tappo bianco) e inserirla nel foro presente sul coperchio del contenitore giallo, esercitando una leggera pressione verso il basso.



- L'urina raccolta andrà automaticamente a riempire la provetta (NB: il mancato riempimento è da ricondursi alla raccolta di un volume d'urina scarso o alla non idonea chiusura del contenitore giallo).
- Scrivere sull'etichetta della provetta così riempita il nome e cognome del paziente.
- Consegnare il campione identificato, al più presto, in qualsiasi Centro prelievo.
- Nel caso in cui non si fosse in possesso della provetta da 9 ml (tappo bianco) è possibile procedere con la raccolta dell'urina nel contenitore con tappo giallo come sopra descritto e provvedere poi al riempimento della provetta tappo bianco presso il centro prelievi, al momento della consegna del campione.



IMPORTANTE: per la raccolta dell'urina per indagini differenti da quella qui indicata, riferirsi alle istruzioni specifiche, utilizzando i contenitori previsti.