ANLAGE 2 Rundschreiben des Gesundheitsministeriums "indicazioni e raccomandazioni per la campagna di vaccinazione autunnale/invernale 2026/2027 anti COVID-19."

Auflistung der Personen denen die Auffrischungsimpfung mit dem neuen angepassten Impfstoff empfohlen wird.

Die Impfung gegen COVID-19 ist für alle kostenlos zugänglich. Sie ist für folgende Personengruppen empfohlen:

- Personen die 60 Jahre und älter sind;
- Bewohner von Langzeiteinrichtungen;
- Schwangere Frauen unabhängig vom Trimester, Frauen im Wochenbett (oder "postpartum") oder während der Stillzeit;
- Sanitäres und soziosanitäres Personal in den Krankenhäusern, auf dem Territorium und in Langzeiteinrichtungen; Medizinstudenten, Studenten in Gesundheitsberufen die Praktika in Betreuungsstrukturen machen, sanitäres und soziosanitäres Personal in Ausbildung;
- Fragile Personen im Alter von 6 Monaten bis zu 59 Jahren welche an Vorerkrankungen, die einen schweren Verlauf für Covid-19 bergen, leiden:
    - Atemwegserkrankungen inklusive schweres Asthma, bronchopulmunale Dysplasie, zystische Fibrose, Chronisch obstruktive Lungenerkrankung – COPD, idiopathische Lungenfibrose, pulmonale Hypertonie, Lungenembolie und all jene Lungenerkrankungen, welche eine Sauerstofftherapie benötigen;
    - Herz-Kreislauf-Erkrankungen (ausgenommen ein isolierter Bluthochdruck), inklusive angeborene und erworbene Erkrankungen des Herzens, Erkrankungen der Herzkranzgefäße, Herzinsuffizienz und Personen welche einen kardiogenen Schock hatten;
    - Erkrankungen der Blutgefäße des Gehirns;
    - Diabetes/andere schwere endokrine Erkrankungen wie Typ 1 Diabetes, Typ 2 Diabetes, Mb. Addison, Panhypopituitarismus;
    - Neurologische Erkrankungen wie amyotrophe Lateralsklerose (ALS) und andere Erkrankungen des Motoneurons, multiple Sklerose, Muskeldystrophie, infantile Zerebralparese, Myasthenia gravis, andere neuromuskuläre Erkrankungen, Immunneuropathien und neurodegenerative Erkrankungen;
    - Obesitas(BMI >30);
    - Dialyse oder chronische Niereninsuffizienz;
    - Hämatopoetische Erkrankungen und Hämoglobinopathien wie Thalasämia major, Sichelzellanämie und andere schwere chronische Anämien;
    - Onkologische und Onkohämatologische Erkrankungen in oder vor immun- oder myelosuppressiver Therapie, bzw. die diese seit weniger als 6 Monaten abgesetzt haben;
    - Personen nach Organtransplantation in immunsuppressiver Therapie;
    - Stammzelltransplantation (bis zu 2 Jahren nach Transplantation oder bei immunsuppressiver Therapie bei graft-versus-host Erkrankung);
    - Warteliste für Organtransplantation;
    - Therapie mit T-Zellen die einen chimären Antigenrezeptor exprimieren (CAR-T Zellen);
    - Angeborene Immundefizienzen (DiGeorge Syndrom, Wiskott-Aldrich Syndrom, allgemeine variable Immundefizienz);
    - Sekundäre Immundefizienz in pharmakologischer Behandlung (z.B. hochdosierte Kortikosteroidtherapie, immunsuppressive Therapie, Biologika die das Immunsystem beeinträchtigen, etc.)

- Anatomische oder funktionelle Asplenie, Personen bei denen eine elektive Splenektomie indiziert ist;
- HIV-Infektion mit Immundefizienzsyndrom (AIDS) oder CD4+ T-Zellen < 200 Zellen/µl oder bei klinischer Indikation;
- Chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder Malabsorptionssyndrom;
- Down Syndrom;
- Leberzirrhose oder schwere chronische Lebererkrankungen;
- Invaliden laut Gesetz 104/1992 Art. 3 Abs. 3.

Da diese Liste nicht vollständig sein könnte, ruft das Rundschreiben im Falle weiterer Zweifel die Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin, die die Krankengeschichte der betreffenden Person kennen, über jene Fälle zu befinden, bei denen das Risiko besteht, dass eine SARS-CoV-2-Infektion die Grunderkrankung verschlimmern oder schwere Formen von Covid-19 auslösen könnte.

Die Impfung wird auch den Angehörigen und Mitbewohnern von besonders fragilen Personen empfohlen.

Zu Beginn der Kampagne wird die Impfung zwar für alle angegebenen Personengruppen empfohlen und steht auch denjenigen zur Verfügung, die nicht in die oben genannten Kategorien fallen, doch wird sie vorrangig Personen im Alter von 80 Jahren und darüber, Gästen in Langzeitpflegeeinrichtungen, besonders fragilen Personen, insbesondere mit einer ausgeprägten Beeinträchtigung des Immunsystems, sowie Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen verabreicht.

Quelle: Rundschreiben des Gesundheitsministeriums 0004398-01/10/2026-DGEME-DGEME-P “indicazioni e raccomandazioni per la campagna di vaccinazione autunnale/invernale 2026/2027 anti COVID-19”.