

PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA

89.7A.9_2

PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA

Tipologia di visita	Tempo massimo di attesa	Indicazioni diagnostiche
Urgente [U]	Pronto soccorso/entro 24 h	Emorragia digestiva acuta Ingestione corpi estranei/caustici Dolore addominale acuto severo Disfagia acuta
Breve [B]	Entro 10 giorni	Adulti: Sospetto strumentale di neoplasia dell'apparato digerente Nuovo caso di Malattia Infiammatoria Cronica Intestinale Ittero di ndd senza colica in atto né colangite (previa esecuzione di esami bioumorali ed ecografia) Diarrea cronica (non infettiva, non colon irritabile) non ancora indagata Nuova comparsa di sintomi addominali di allarme (disfagia, odinofagia, calo importante di peso, massa addominale) Bambini: Calo ponderale (già indagato con esami di primo livello) Ematochezia Sospetto di IBD (Inflammatory bowel disease o malattie infiammatorie intestinali) Sospetto di malattia celiaca e/o malassorbimento (con esami sierologici già eseguiti)
Differibile [D]	Entro 30 giorni	Adulti: Anemia sideropenica di possibile origine dal piccolo intestino (EGDScopia e colonscopia negative) Sospetto di malattia celiaca e/o malassorbimento (con esami sierologici e strumentali già eseguiti) Dolore addominale cronico con sintomi di allarme endoscopicamente ed ecograficamente negativi Dolore addominale persistente localizzato ai quadranti inferiori

Tipologia di visita	Tempo massimo di attesa	Indicazioni diagnostiche
		Recente alterazione test funzione epatica Bambini: Alterazione di funzione epatica con esami di laboratorio e strumentali già eseguiti Deficit accrescitivo ponderale
Programmata [P]	Prestazione che può essere programmata in un arco temporale maggiore, in quanto non influenza prognosi, dolore, disfunzione o disabilità. Da erogarsi, in ogni caso, entro 120 giorni.	Pz di età inferiore ai 45 anni con sindrome dell'intestino irritabile Pz di età inferiore ai 45 anni con sindrome da reflusso gastroesofageo o sindrome dispeptica