

EGDS

45.13_0	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS]
45.16.1_0	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS] CON BIOPSIA IN SEDE UNICA. Non associabile a: Biopsia dell'esofago (42.24 e 42.24.1); Biopsia dello stomaco (44.14); Biopsia del duodeno (45.14.1)
45.16.2_0	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS] CON BIOPSIA IN SEDE MULTIPLA. Non associabile a: Biopsia dell'esofago (42.24 e 42.24.1); Biopsia dello stomaco (44.14); Biopsia del duodeno (45.14.1)
42.24_0	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS] CON BIOPSIA DELL'ESOFAGO

Tipologia di visita	Tempo massimo di attesa	Indicazioni diagnostiche
Urgente [U]	Pronto soccorso/entro 24 h	Emorragia digestiva in atto (ematemesi, melena, enterorragia massiva)
		Ingestione caustici
		Ingestione corpi estranei
Breve [B]	Entro 10 giorni	Anemia sideropenica sintomatica con Hb < 10
		Sintomi di allarme: vomito significativo e persistente, disfagia, odinofagia, calo ponderale con sintomi digestivi
		Necessità di escludere lesioni per terapie o interventi chirurgici urgenti
		Sospette neoplasie rilevate obiettivamente e/o con diagnostica strumentale
		Massa addominale
Differibile [D]	Entro 60 giorni	Anemia sideropenica cronica
		Sindrome dispeptico-dolorosa in paziente con età sopra i 45 anni
		Sindrome da reflusso gastroesofageo in pazienti > 45 anni (non indagata con EGDS) o non responsivi alla terapia
		Biopsia per sospetta celiachia/malassorbimento
	Prestazione che può essere programmata in un arco	Sindrome dispeptica-dolorosa in pazienti di età inferiore ai 45 anni (mai indagata con EGDS), con sintomi che persistono anche dopo trail terapeutico

Tipologia di visita	Tempo massimo di attesa	Indicazioni diagnostiche
Programmata [P]	programmata in un arco temporale maggiore, in quanto non influenza prognosi, dolore, disfunzione o disabilità. Da erogarsi, in ogni caso, entro 120 giorni.	