

Test rapido droghe nelle urine

Informazioni generali

Codice accettazione	Profilo (TRIAGE)
Indicazioni cliniche [RIF.1]	- Il test viene utilizzato per la determinazione qualitativa di varie droghe/farmaci nelle urine. - Si utilizza specialmente per diagnosi differenziale, in caso di sospetta tossicodipendenza o intossicazione.
Preparazione del paziente	NP
Richiedibile in urgenza (Valido solo per pazienti interni)	Si (richiedibile giornalmente dalle ore 0:00 alle ore 24:00)
Dove effettuare il prelievo per pazienti esterni	ND Prelievo eseguito solo presso i reparti dell'Ospedale Regionale di Bolzano per i pazienti ricoverati
Esecuzione	Giornaliera
Tempo di refertazione per pazienti esterni	ND Pazienti interni entro 90 minuti

Preanalitica

Tipo di campione	Urina spot
Tipo provetta	Tappo bianco con inserto nero 10 ml
Trasporto del campione	A temperatura ambiente
Trattamento del campione in laboratorio	Nessun trattamento
Criteri per la non accettabilità del campione	Volume insufficiente, non corretta identificazione del paziente
Stoccaggio del campione dopo l'analisi	7 giorni a 2-8°C
Possibilità di richiesta su campione già processato	A seconda della stabilità del campione per il periodo di stoccaggio

Indicazioni tecniche

Misurando	Concentrazione delle seguenti sostanze d'abuso: amfetamina, barbiturici, buprenorfina, benzodiazepine, cocaina, ecstasy (MDMA), metamfetamina, metadone, oppiacei, antidepressivi triciclici, tetraidrocanabidolo, tramadolo, paracetamolo, ketamina, fenciclidina, LSD, fentanil.														
Metodo [RIF.2]	Test immunologico														
Range di riferimento [RIF.2]	<table> <tr><td>Amfetamina</td><td><500 ng/ml</td></tr> <tr><td>Barbiturici</td><td><200 ng/ml</td></tr> <tr><td>Buprenorfina</td><td>< 5 ng/ml</td></tr> <tr><td>Benzodiazepine</td><td><200 ng/ml</td></tr> <tr><td>Cocaina</td><td><300 ng/ml</td></tr> <tr><td>Ecstasy (MDMA)</td><td><500 ng/ml</td></tr> <tr><td>Metamfetamina</td><td><500 ng/ml</td></tr> </table>	Amfetamina	<500 ng/ml	Barbiturici	<200 ng/ml	Buprenorfina	< 5 ng/ml	Benzodiazepine	<200 ng/ml	Cocaina	<300 ng/ml	Ecstasy (MDMA)	<500 ng/ml	Metamfetamina	<500 ng/ml
Amfetamina	<500 ng/ml														
Barbiturici	<200 ng/ml														
Buprenorfina	< 5 ng/ml														
Benzodiazepine	<200 ng/ml														
Cocaina	<300 ng/ml														
Ecstasy (MDMA)	<500 ng/ml														
Metamfetamina	<500 ng/ml														

	Metadone	<300 ng/ml	
	Oppiacei	<300 ng/ml	
	Antidepressivi triciclici	<300 ng/ml	
	Tetraidrocannabinidolo	< 50 ng/ml	
	Tramadolo	<200 ng/ml	
	Paracetamolo	<5000 ng/ml	
	Ketamina	<1000 ng/ml	
	Fenciclidina	< 25 ng/ml	
	LSD	< 10 ng/ml	
	Fentanil	< 10 ng/ml	
Stabilità del campione [RIF.2]	18-22°C: 2h	2-8°C:2 gg	-20°C: >2 gg
Tempo di emivita dell’analita [RIF.3]	ND		
Variabilità analitica (%) [RIF.4]	ND		
Variabilità biologica intraindividuale (%) [RIF.5]	ND		
Differenza critica (%) [RIF.6]	ND		
Incertezza di misura (U _m) omogeneo [RIF.4]	ND		
Interferenze [RIF.2]	Vedi foglietto illustrativo		
Significatività clinica			
Valori elevati [RIF.1]	• Presenza di intossicazione • Abuso di sostanze stupefacenti		
Valori bassi [RIF.1]	• Assenza di intossicazione o di abuso • Diluizione fisiologica o intenzionale		
Parametri correlati	Creatinuria		
Per ulteriori informazioni			
Segreteria	Tel. 0471-438306		
Riferimenti bibliografici	[RIF.1] Thomas L: Labor und Diagnose. Frankfurt 2012 (8 Auflage) [RIF.2] Bugiardino [RIF.3] World Health Organization, Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2 [RIF.4] Dati interni [RIF.5] EFLM Biological Variation Database [RIF.6] Il teorema di Bayes nella diagnostica di laboratorio-Appendice E-ver 1.0		
Preparato il	15.12.2021		
Prossima revisione prevista	15.12.2024		